

两个地方特色肉鸡品种

一、德化戴云黑鸡

1. 品种形成 德化戴云黑鸡主产于福建省德化县戴云山主峰和九仙山周边的村落,属优质肉鸡地方品种,具有独特的品种特征特性。

2. 体形外貌 德化戴云黑鸡公鸡的重要特征是:全身羽毛深黑、呈片羽状,主翼、背部和尾部羽毛呈墨绿色;单冠直立呈黑紫色,冠尖一般为 5~8 个;乌喙、乌脚、乌骨、乌灰皮、乌灰肉等。母鸡形似公鸡,但体型较小。

3. 肥育、繁育性能 德化戴云黑鸡的生长速度较慢,据测定 5 月龄公鸡的平均体重约为 1650 克,母鸡约为 1350 克。6 月龄公鸡半净膛屠宰率为 82.9%,全净膛屠宰率为 73.2%;6 月龄母鸡半净膛屠宰率为 80.8%,全净膛屠宰率为 69.2%。德化戴云黑鸡小公鸡 5 月龄开啼后即可配种。母鸡 6 月龄开产,年产蛋约 120 枚,平均蛋重 40~45 克,蛋壳为浅褐色。


德化戴云黑鸡有丰富的黑色素,胆固醇含量低,

肉质鲜美甘润,风味独特,且具有滋阴补肾、祛风湿等功效,是膳食和滋补佳品。

二、安义瓦灰鸡

安义瓦灰鸡是从江西省安义县本地鸡种中经过长期自然选育而成的具有地方特色的传统优良品种,是集营养、保健为一体的肉药型家禽。具有灰羽、灰皮、灰脚、灰喙、灰冠“五灰”特征。该鸡肉嫩、汁鲜、味美,富含氨基酸、微量元素等营养物质,脂肪和胆固醇含量低。安义瓦灰鸡适应性广、耐粗饲、抗病力强,尤其适宜棚舍散养,喜食青草、昆虫等,是生产绿色保健食品的绝佳原料。有治疗中暑、伤寒、小儿惊风和妇女习惯性流产的功效,自古民间作为验方流传于今。

(刘鸿涛 刘志军 黄礼木)



介绍几种优质牧草

紫花苜蓿 紫花苜蓿是豆科多年生牧草,茎光滑,直立或倾斜,高 100~150 厘米,分枝多达 25~40 枝,适宜在温暖半干旱气候和土层深厚、排水良好的条件下生长。苜蓿生长最适温度为 25 左右,其耐寒性较强,可耐 -20~-30 的低温,且有较强的耐旱性,可在平地 and 山地种植。3~10 月份均可播种,667 平方米播种量 0.75~1.0 千克。667 平方

米年产鲜草 2000~4000 千克,产量以第三年最高。青刈或放牧均可,可作为奶牛、羊、家兔、鱼等的饲料。

墨西哥玉米 青饲料类玉米新品种,为一年生草本植物,株高 3~4 米,分蘖力强,每丛有 30~60 多个分枝,高的可达 90 个。墨西哥玉米枝叶繁茂,质地松脆,有甜味,是草食家畜、禽、鱼的极佳青饲料。一般春季播种,667 平方米用种量 0.5~0.75 千克。苗高 40 厘米可刈割,第一次留茬 5 厘米,以后每隔 15~20 天可刈割一次,年刈割 7~8 次,667 平方米产青茎叶 10000~20000 千克。

串叶松香草 为多年生牧草,一次种植可连续利用 10 年,3~10 月份均可播种,可点播或育苗移栽,667 平方米用种量 0.25~0.5 千克,年可刈割 3~4 次,产鲜草 18000~20000 千克。可作为猪、牛羊等的饲料。

多年生黑麦草 多年生禾本科牧草,生长快,分蘖多,繁殖力强,茎叶柔嫩光滑,品质好,畜禽鱼皆喜食,可春播和秋播,667 平方米用种量 1~1.5 千克,一般以条播为宜。多年生黑麦草年刈割 3~5 次,667 平方米产鲜草 5000~8000 千克,高的可达 10000~15000 千克。

(辽 东)

菜用豆——黄籽豆、五月半

近几年从菜用大豆(毛豆)资源材料中筛选出两个优良地方品种黄籽豆和五月半,两品种不仅是鲜食的优良品种,也适于速冻加工。

1. 黄籽豆 株高约 50 厘米,株型紧凑直立,分枝少,结荚多,花白色。平均青荚长 5.6 厘米、宽 1.1 厘米、厚 0.7 厘米,荚上茸毛灰白色,多数荚含种子 2 粒,单荚重约 2.7 克。青豆粒浅绿色,粒大饱满,质脆嫩。每 100 克青豆粒含干物质 28 克、蛋白质 11.3 克。老熟种子圆粒,黄色,百粒重 20 克。早熟,在华北地区夏播生育期(自播种至采收青荚)约 70 天。

2. 五月半 株高 80 厘米,株型紧凑直立,有 3~4 个分枝,结荚多,花紫色。青荚长约 5.8 厘米、宽约 1.1 厘米、厚约 0.5 厘米,茸毛灰白色,平均单荚重约 1.6 克。青豆粒绿色,百粒重约 30 克。每 100 克青豆粒含干物质 40.4 克,蛋白质 15.7 克。老熟种子浅绿色,百粒重约 18 克。中晚熟,在华北地区夏播生育期约 90 天。

(100081 中国农业科学院蔬菜花卉研究所 徐兆生 魏民)