

## 1 选购优质雏鸡

商品代雏鸡应来自优秀父母代种鸡场或专业孵化厂。选择活泼、大小整齐的健康鸡雏。雏鸡不能携带鸡白痢、禽白血病和霉形体等传染性疾病。不得从疫区购买鸡雏,要严把进雏质量关。

品种应选桃源鸡、仙居鸡、固始鸡、肖山鸡、庄河鸡、三黄鸡、清远麻鸡、杏花鸡等。它们具有体型小、毛色美观、活泼好动、耐粗饲、抗病力强的特点,而且产蛋率高、蛋的品质好、肉质细嫩、味道鲜美可口、适于放养,深受食客和养鸡户的喜爱。

## 2 严格管理

### 2.1 严格执行消毒程序

鸡舍周围,每 2~3 星期消毒 1 次,鸡场周围及场内污水池、排粪坑、下水道出口,每 1~2 个月消毒 1 次。鸡场、鸡舍进出口要设消毒池,每星期更换 1 次消毒药。

鸡舍内要定期进行带鸡消毒,正常情况下每星期 1 次,有病情下可每星期 2 次,在免疫前、中、后 3 天不进行带鸡消毒。空舍要进行彻底清扫、洗刷、药液浸泡、熏蒸消毒。消毒后至少闲置 2 星期才可进鸡。进鸡前 5 天再进行熏蒸消毒 1 次。定期对蛋箱、蛋盘、喂料器等用具进行清洗和熏蒸消毒。

### 2.2 鸡场内应分设净道和脏道

净道是专门运输饲料和产品的通道;脏道是专门运输鸡粪、死鸡和垃圾的通道。净道和脏道不能交叉。死鸡及时运走焚烧或深埋,鸡粪及时运到指定地点,采用堆积生物热或干燥的处理方式作为农业用肥,不得作为其他动物的饲料。

鸡舍通风口应设置纱窗或安装铁丝网,防止鸟、兽进入。定期灭鼠,投放鼠药要定时、定点,及时收集死鼠和残余鼠药,并进行无害化处理。

### 2.3 坚持全进全出制饲养

全进全出制是指用一个鸡场或同一鸡舍饲养同一批鸡,采用统一饲料、统一免疫程序、统一管理措施和同时出场。出场后对整体环境实行彻底打扫、清洗、消毒。该制度的实施,能彻底切断传染病的流行环节,消灭鸡舍病原体,从而保证下一批鸡的安全生产。蛋鸡场要把成年鸡、育成鸡、雏鸡隔离饲养,其设备、管理以及饲养人员也应分开。

### 2.4 常备清洁饮水

鸡的饮水要符合国家标准。感官性状不得有异臭、异味、不含肉眼可见物,pH 值 6.4~8.0,细菌学检

标为,大肠杆菌不超过 1 个/100 毫升。饮水使用前和使用过程中要进行水质分析和检测。经常清洗、消毒饮水设备。要采用封闭式节水饮水系统。

### 2.5 选用优质饲料

使用符合无公害标准的配合饲料,建议参考使用饲养品种手册提供的营养标准。

饲料包括配合饲料、浓缩料、添加剂和原料等,在感官上都应具有一定的新鲜度,具有该品种应有的色、嗅、味和组织形态特征,无发霉、变质、虫蚀、结块及异味现象。添加剂产品应取得产品生产许可证、产品批准文号。产蛋期及开产前 5 星期鸡饲料中不使用药物饲料添加剂、制药工业副产品。

不应在饲料中额外添加增色剂。

### 2.6 按标准用药

蛋鸡在雏鸡、育成鸡前期用于预防和治疗疾病的药物要符合国家规定的 NY5040 标准,即无公害食品蛋鸡饲养允许使用的兽药。

育成鸡后期(产蛋前 7~10 天)停止用药。产蛋阶段正常情况下,禁止使用任何药物,包括中草药和抗菌素。

产蛋阶段发生疾病用药物治疗时,在整个用药过程中,所产鸡蛋不得作为商品蛋出售。

### 2.7 免疫接种和疫病检测

根据《防疫法》及配套法规要求,结合当地实际情况,有选择地进行预防接种工作。

做常规疫病检测工作,如高致病性禽流感、新城疫、禽白血病、白痢与伤寒等。

药物预防。宜采用中药、生物制品、矿物性药物等无公害药物防治,严格控制抗生素、激素及有害化学药品的使用。