



念好大棚养殖肉鸡经

从2000年以来,笔者就开始大棚养殖肉鸡,成功经验总结颇多,现与读者分享。

坚持一个理念

即“全进全出”饲养的理念。同一栋鸡舍饲养同一日龄的雏鸡,在出售时同时全部出场。优点是便于采取统一的温度,同标准的饲料,出场后统一打扫、清洗、消毒,以杜绝循环感染。熏蒸消毒后封闭7天再接养下一批雏鸡。

“全进全出”制比“连续生产”制增重快、耗料少、死亡率低、生产效益高。

解决四个问题

1. 胸囊肿的问题。就是肉鸡胸部皮下发生的局部炎症,是肉仔鸡常见的疾病。它不传染也不影响生长,但影响屠体的商品价值和等级。

应该针对产生原因采取有效措施:(1)尽量使垫草干燥、松软,及时更换板结、潮湿的垫草,保持垫草应有的厚度。(2)减少肉仔鸡卧地的时间,肉仔鸡一天当中有68%~72%左右的时间处于卧伏状态,卧伏时体重的60%左右由胸部支撑,胸部受压时间长,压力大,胸部羽毛又长得晚,故易造成胸囊肿。应采取少喂多餐的办法,促使鸡站起来采食、活动。(3)若采用铁网平养或笼养时,应加一层弹性塑料网。

2. 腿疾的问题。随着肉仔鸡生产性能

的提高,腿部疾病的严重程度也在增加。引起腿病的原因是各种各样的,归纳起来有以下几类:遗传性腿病,如胫骨发育异常,脊椎滑脱症等;感染性腿病,如化脓性关节炎、鸡脑脊髓炎、病毒性腱鞘炎等;营养性腿病,如脱腱症、软骨症、维生素B₂缺乏症等;管理性腿病,如风湿性和外伤性腿病。

预防肉仔鸡腿病,应采取以下措施:

(1)完善防疫保健措施,杜绝感染性腿病。(2)确保微量元素及维生素的合理供给,避免因缺乏钙、磷而引起的软脚病,缺乏锰、锌、胆碱、尼克酸、叶酸、生物素、维生素B₆等所引起的脱腱症,缺乏维生素B₂而引起的跛趾病。(3)加强管理,确保肉仔鸡合理的生活环境,避免因垫草湿度过大、脱温过早,以及抓鸡不当而造成的脚病。

3. 腹水的问题。腹水是一种非传染性疾病,其发生与缺氧、缺硒及某些药物的长期使用有关。

控制肉鸡腹水症发生的措施:(1)改善环境通气条件,特别是密度大的情况下,应充分注意鸡舍的通风换气。(2)防止饲料中缺硒和维生素E。(3)发现轻度腹水症时,应在饲料中补加维生素C,用量是0.05%。同时,对环境和饲料应做全面检查,采取相应的措施,以控制腹水症的发展。8~18





抽奖公告

2007年6月11日,由山东农业知识杂志社主办的“订《农业知识》杂志中大奖”2007年第7期抽奖活动在济南市举行。抽奖结果:7月份一等奖中奖者是山东省莱城区高庄街道办事处白马峪村丁光军和江苏省灌南县张店镇腰庄村二组卢建强。二等奖中奖者是山东省荣成市虎山镇桥头村周志恒、山东省五莲县山阳乡窝子村66号郑召军和山东省济南市长清区归德镇曹楼村三队曹世伟。三等奖中奖者是山东省威海市环翠区羊亭镇北郊村毕见辉、福建省屏南县寿山村54号苏享节、山东省莘县古云镇齐堤口村李合英、江苏省海门市树勋镇富民村5组吴永清和山东省安丘市关王镇申明、董庆南。纪念奖名单从略。你们将收到由我社寄出的奖品。联系电话:139535267。

日龄只喂给正常饲料量的80%左右,可防止腹水症的发生。

4. 猝死的问题。其症状是多在一些增重快、体大、外观正常健康的鸡突然狂叫,仰卧倒地死亡,剖检:肺肿、心脏扩大、胆囊肿小。发病原因可能与饲养管理有关。

预防:(1)在饲料中适量添加多维。(2)加强通风换气,防止密度过大。(3)21日龄以前喂粉料,以后喂颗粒料,或在8~20日龄进行限制饲养。(4)避免突然的应激。

抓好五项管理

1. 做好雏鸡保温:育雏成败的关键之一在于给予适当的温度。这是因为初生雏鸡的体温调节机能较弱,难以适应外界温度的变化。特别是在气温低的季节,如果育雏温度过低,雏鸡身体会蜷缩,并互相挤压取暖,甚至密集成堆,影响采食和活动,有时会挤压踩踏,造成伤残;如果受凉还会引起拉稀或产生呼吸道病等,严重时造成大量死亡。

2. 防止氨气蓄积。鸡群排泄的粪便和潮湿的垫料不及时清除,致使鸡舍内氨气蓄积,浓度升高,导致肉鸡氨气中毒或引发其他疾病。

为了防止氨气对肉鸡的不良影响,建议抓好下述饲养管理工作:铺设的垫料要有一定的厚度,一般在5厘米以上,操作时尽量少洒水,防止饮水器漏水,弄湿垫

料,如果鸡舍内湿度过大,则应及时清除舍内粪便及潮湿的垫料。此外,可使用吸氨除臭剂来降低鸡舍的氨气浓度,常用的有硫酸亚铁、过磷酸、硫酸铜、熟石灰等。

3. 加强免疫防病。根据当地鸡病流行情况,制订符合该场实际的免疫程序,并按要求及时接种各种疫苗。所选用的疫苗应该来自正规厂家或经国家主管部门认可的疫苗,用前进行效价监测,并正确贮存和使用。

4. 搞好鸡场卫生。首先,应从健康种鸡场引进鸡苗,严防经垂直传播带进病原体。其次,应创造良好的饲养环境。饲养用具与消毒用具严格区分,并定期消毒,严防水平传播疾病。第三,坚持带鸡消毒,消灭鼠害,严防鼠害传播疾病,病死鸡要烧埋处理,病鸡与健康鸡隔离的原则。

在观察鸡群过程中,发现死鸡要及时捡出来进行焚烧或深埋,不能把死鸡存放在鸡舍内、饲料间和鸡舍周围。捡完死鸡后要用消毒液洗手。每批鸡出栏后,彻底清理鸡粪,并运到远离鸡舍的地方堆积发酵。

5. 控制药物残留。商品肉鸡在生产中的药残问题是影响肉品质量的重要因素。生产过程中严格禁止使用禁用药,并根据产品质量要求,随时调整用药程序和方法,严格执行肉鸡宰前停药期限,确保鸡肉质量。(李连胜 沂水县院东头乡角泉村)

科学养殖

7
2007

