

早春鹅饲养要点

每年3月上旬至4月上旬,养殖户可以进雏饲养早春鹅,饲养60~70天,鹅平均体重可达2.5千克以上。饲养早春鹅主要做好以下工作:

雏鹅饲养 雏鹅爱吃叶菜类饲料。给雏鹅开食,可将青菜切成细丝,拌到半生半熟的碎米饭里,一般碎米饭占20%~30%,青菜占70%~80%。把拌好的饲料撒在干净的草席上或者塑料薄膜上,让鹅自由采食。1~7日龄时,白天喂6~7次,夜里喂2~3次。随着鹅的长大,喂料次数可逐渐减少。早春天气较冷,可以在屋里放上水盆,让小鹅自由饮水。天暖后可将小鹅装在竹篮里,放到河边浅水里让小鹅戏水,时间不要太长,一次2~3分钟,每天2~3次。一个星期后可以在晴天中午把小鹅赶到河里去。另外,雏鹅14日龄以前室内温度须保持在20℃以上,垫草要勤换勤晒,保持地面清洁干燥。

鹅群放牧 第一次放牧选择在无风的晴天,给鹅喂完食后,把它们赶到附

近草地上,让其自由活动,1小时后,让鹅回棚休息,以后慢慢延长放牧时间和距离。20天后,白天可以完全放牧,只在晚上喂一次料,1个月后,晚上也不用补料。一般250~300只鹅为一群,由两人管理比较合适。放牧时,最好把鹅群赶成长方形,让鹅慢慢前行,不能太快太散,要让所有的鹅都吃上草料。早晨天一亮,就可以把鹅群赶出棚,让鹅吃露水草。中午赶回棚休息,下午再出去,日落回棚。如整天在田野放牧,中午要把鹅群赶到树阴下休息。阴雨天不放牧。

疾病防治 饲养早春鹅主要防治小鹅瘟及流行性感冒。防治小鹅瘟主要依靠预防接种增强免疫力。用小鹅瘟疫苗接种成年母鹅,每只鹅在产蛋前1个月注射稀释100倍的小鹅瘟疫苗1毫升,一个月后产生免疫力,这时留的种蛋因母鹅体内含有抗体,孵出来的小鹅就可以得到免疫。预防流行性感冒,可将土霉素片碾成粉,按万分之二的量拌入饲料饲喂。治疗可用青霉素按每千克鹅体重2万单位肌肉注射。此外,用蒜泥加糖水灌服也有预防和治疗作用。(高峰)

肉鸡三层架床网饲养法

三层架床网饲养肉鸡具有四个优点:一是节省垫料。二是鸡体不接触粪便,便于防疫。三是可提高鸡舍利用率。四是肉鸡活动范围小,能量消耗少,生长速度快。

架床制备 架床共分3层,每层宽1.5~2米、高0.6米,每个层面按25厘米间隔钉上木条,木条上铺塑料网,架床四周也用塑料网围住,防止鸡从架上掉落。

控制温度 雏鸡0~7日龄保持饲养舍温度在32~35℃,8~14日龄保持在30~32℃,15~21日龄保持在28~30℃,22~28日龄保持在26~28℃,以后保持在25℃左右。

保持光照 雏鸡1~3日龄时每天保持光照24小时,每20平方米悬挂1只

60瓦的灯泡,悬挂高度2米。3日龄后每天保持光照23小时,每20平方米悬挂1只25瓦的灯泡,悬挂高度2米。

日常管理 采用自然通风或用排风扇通风。采用全价配合饲料,让鸡自由采食与饮水。

预防疫病 雏鸡0~7日龄时,在饮水中加环丙沙星、氧氟沙星等广谱抗生素,消除母源性传染病。10日龄时,用新城疫II系苗滴鼻,同时在每只鸡颈背部皮下注射新城疫油乳剂0.25毫升。16日龄时,用法氏囊炎弱毒苗点眼或饮水。24日龄时,用新城疫II系苗点眼或饮水。35日龄时,再用法氏囊炎弱毒苗点眼或饮水。(周德民 新疆石河子市150团二营13连 832056)