

# 肉鸡养殖巧用油 增重加快效益高

辛 丰

油脂饲料代谢能值高,是肉鸡养殖户进行标准化生产时日粮中不可缺少的重要原料。但是由于部分养殖户在饲养肉鸡过程中,对油脂的使用不够科学,其主要表现在混合日粮不均匀,添加比例过少,日粮存放时间长等问题,从而影响了肉鸡的饲养效果。先把用油脂饲养肉鸡的科学使用方法介绍如下,供养殖户参考:

1. 添加目的与作用:经试验研究证实,肉鸡日粮中添加油脂后,可使饲料的能量和蛋白质的利用率显著提高,使肉鸡生长速度明显加快。

2. 种类与添加量:油脂的种类包括动物油和植物油。动物油包括

猪油、牛油、鱼油等。植物油包括菜籽油、棉籽油、玉米油等。一般来讲,肉鸡日粮中油脂的最佳用量前期为0.5%,后期为5%~6%,此添加量可保持肉鸡较快的生长速率和最佳的经济效益。

3. 使用方法:因油脂黏性大,所以如果添加不当则很难拌匀。采用人工添加时,要先做到先加热将油脂融溶,再逐步用粉料扩大稀释,均匀拌和,最后与剩余日粮的其他部分混匀,切忌油脂直接与饲料添加剂混合,以防“油一球”现象的发生。最好用喷雾器把油脂均匀地喷洒到颗粒饲料表面上。有条件生产颗粒饲料的,也可把添加量的30%油脂加入到颗粒饲料中,另

70%喷到颗粒料表面上,从而提高适口性。

4. 注意事项:肉鸡养殖使用油脂应注意以下几点:(1)不可使用变质油脂,同时还要注意对日粮中营养素的补充;(2)油脂添加以后,由于提高了日粮中的能量水平,饲料中其他营养成分也要做相应地调整,特别是要保持蛋白能量比不变;(3)饲料贮存时间不宜过长,存放时间越短越好,一般来说,含油脂饲料夏天贮存时间最长不要超过7天,冬天最长不超过3周为宜;(4)饲料中应加入抗氧化剂。(吉林省大安市龙沼动植物诊所 邮编:131300)

## 霉变饲料去毒法

新 城

对霉变饲料的再利用必须持慎重而科学的态度。霉变严重的饲料必须报废,轻度霉变饲料可采用以下方法去毒。注意:采用以下方法处理的饲料仍含有一定的毒性物质,都应限量和其他未发霉饲料搭配使用。

1. 水洗去毒法:将发霉的饲料放入缸中,加清水(最好是开水)泡开,用木棒搅拌。如此清洗5~6次

后,便可用来饲喂畜禽。

2. 挑选法:用手工或机械挑选,剔除霉变的饲料。在饲料霉变的早期,霉变只限于局部发生时,将霉变部分剔除后将未霉变部分干燥处理,一般可达到去毒的目的。

3. 蒸煮去毒法:将发霉饲料放在锅中,加水煮沸30分钟,或蒸煮1小时,去掉水分即可去毒饲用。

4. 碱去毒:按每100千克霉粮加

水200千克,再加苏打粉500克或石灰1千克,共煮。要把粮煮到开裂后30分钟,让其冷却,然后用清水洗到没有异味为止。

5. 氨气去毒法:将发霉饲料的含水量调到15%~22%,放入缸中,通入氨气,然后密封12~15天,再晒干,使之含氨量减少后即可饲用。

6. 石灰水去毒法:将霉变饲料放入10%的纯净石灰水中浸泡3天,再用清水洗净,晒干后即可去毒。(山东省东平县畜牧局 邮编:271500)