



肉鸡腹水综合征的防治

寒冷季节，鸡舍往往因密封太严而通风不良，致使垫料潮湿，加之鸡的饲养密度较其它季节大，极易使鸡因供氧不足而出现腹水综合征。这一情况在肉鸡中尤为常见。

症状 病鸡生长发育迟缓，精神不振，羽毛蓬乱。严重时病鸡腹部膨大，不愿活动，呼吸困难，鸡冠颜色变暗，有时突然死亡。死亡的鸡大多有肺部病变，并伴有肝硬化、全身淤血等症状。

防治 一、消除可能损伤肉鸡呼吸器官的各种不利因素。注意保持舍内空气流通，以防一氧化碳、氮气等有害气体聚积；

用煤炉供暖的鸡舍一定要保持舍内通风良好，避免肉鸡一氧化碳中毒。二、调整饲养密度。根据鸡舍的通风状况和面积，合理安排肉鸡的饲养密度。三、保持鸡舍内适宜的湿度。舍内湿度大，垫料易受潮，粪便在潮湿的垫料中易发酵并产生大量氨气，从而刺激肉鸡的呼吸器官。舍内湿度小，粉尘飞扬，同样会损害肉鸡的呼吸器官。四、做好肉鸡传染性喉气管炎、传染性支气管炎、新城疫等疫病的预防接种工作。五、防止鸡饲料中食盐过量及维生素缺乏。六、不用煤焦油类的消毒药喷洒鸡舍，以免刺激肉鸡的呼吸器官。七、鸡群一旦发生腹水综合征，应尽早查出病因并将其消除，同时使用利尿剂，以消除病鸡的腹水症状，但要注意限制病鸡的饮水量并调整饲料中的钠盐含量。(李大刚)

新生子兔不吃奶症是因母兔怀孕后期营养不平衡所致。此症在子兔出生后 2~3 天发病，在同一窝内，部分或整窝相继发病。患病子兔表现为不吮乳，皮肤凉而发暗，全身绵软无力，最后于昏迷状态下死亡。

治疗方法：用自行车气门芯乳胶管 2 厘米套在注射器的接嘴上，吸取 25% 的葡萄糖液后，将乳胶管插入患病子兔口中，缓缓推

动活塞，每只子兔服 1~2 毫升；对已不会吞咽的子兔，则腹腔注射 5%~10% 的葡萄糖溶液 4~5 毫升。为巩固疗效，间隔 4~5 小时重复治 1 次，并在随后连续 3 天补充葡萄糖液，每天 2 次。(傅春贵)



巧治新生子兔不吃奶症

中药治兔毛球病：大黄 180 克、厚朴 90 克、枳实 90 克、芒硝 400 克，共研 养 殖 小 知 识
末。每只家兔取末 10~20 克口服，可治家兔毛球病，1~2 次即愈。(琅文)