

# 肉鸡保健程序

钱大勇

日龄	产品及保健方法	用药目的
1	“禽速健”饮水1次	净化垂直传播的免疫抑制性疾病
1~3	“杆立清”饮水1天1次 “活力元”饮水1天1次	净化沙门氏菌、大肠杆菌，激活免疫系统，提高免疫力
1~23	“润生康”拌料	提高免疫力和肠道功能，维持肠道内环境平衡
7	免疫新城疫和传染性支气管炎疫苗	预防新城疫和传染性支气管炎
8~10	“咳嗽奇效”饮水，1天1次	预防应激性呼吸道病
14	免疫传染性法氏囊病疫苗	预防传染性法氏囊病
16~18	“球清”拌料，1天1次， “肠毒综合灵”饮水，1天1次	保护肠道黏膜，预防球虫病
21	免疫新城疫疫苗	预防新城疫
22~24	“禽速康”饮水，1天1次。 “杆菌杀手”饮水，1天1次 晚间“肝肾嘉”饮水，1天1次	修复呼吸道黏膜，预防病毒性呼吸道病及与大肠杆菌病的混合感染，保肝护肾
25~29	“双黄止痢散”拌料 “球光”饮水，1天1次	预防大肠杆菌病、球虫病、肠道病
30~32	“禽速健”饮水，剂量加倍使用3次	预防病毒性疾病
34~出栏	“嘉肥宝”拌料	催肥、促进采食、控制肠道病 该阶段为疾病高发期，以治疗为主

## 雏鸡新城疫诊治

北京伟嘉集团东北事业部 潘兴军

某养殖户饲养白羽肉鸡4000只，笔者于9日龄时接诊。鸡群最初表现零星死亡，死前无明显症状，采食、饮水正常，一旦发现精神不振的鸡只，很快死亡，且死亡率渐增，使用头孢曲松、黄芪多糖、干扰素等治疗均无


肝脏瘀血，有轻微盲肠炎，盲肠扁桃体出血，直肠末端轻微点状出血，法氏囊有炎症，肾脏尿酸盐沉积但不肿胀。根据临床表现和剖检结果，确诊为雏鸡新城疫。

严禁紧急接种，会导致大量死亡。每瓶“禽速康”使用125公斤水稀释，每瓶“杆菌杀手”使用150公斤水稀释后饮水，在饲料中加入抗病毒中药，如扶正解毒散，连用4天。用药第2天大群好转，第3天死亡率下降，第4天只有零星死亡，且均为久病鸡只。

雏鸡患新城疫主要存在以下几种诱因。第一，种鸡在产蛋期发生非典型新城疫，该鸡群所产雏鸡的易感性高。第二，种蛋孵化时消毒不严格，环境中的新城疫病毒附着在蛋壳表面，啄蛋壳时被动食入病毒，出壳的弱雏增加、体质下降。第三，母源抗体低下，不能阻止新

城疫病毒经呼吸道黏膜感染发病。第四，育雏舍环境污染严重，消毒不彻底，空舍时间短。第五，同一批雏鸡有的发病有的不发病，这与运输过程中的应激及消毒有关，如运输车或饲料、饮水用具等被新城疫病毒感染。

广大养殖户要选择信誉好、技术力量雄厚的种鸡场购买雏鸡，进雏前育雏舍应认真清扫，消毒熏蒸后空舍1个月再进鸡，根据母源抗体监测结果，严格做好免疫接种。



禽速康



杆菌杀手

明显效果。剖检病鸡可见腺胃乳头水肿，病程后期腺胃乳头出血，腺胃肌胃交界处出现铁锈样溃疡面，