



7日禽病速报

河北地区

雏鸡: 近来在元氏、井陘等地区以20日龄左右的雏鸡传染性法氏囊病多发,其症状典型。建议养殖户控制舍内的温差,及时消毒。

蛋鸡: 因天气炎热,温度较高引起的鸡产蛋疲劳和腹泻的疾病多发。其次以肠毒综合征、球虫病以及霉菌病多发。由于夏季鸡只采食量较低等诸多因素可引起的营养物质吸收不足,建议饮水中添加电解质或多维。

永康养殖服务信息中心 王俊敏

青年鸡: 在辛集地区以大肠杆菌病和肠炎多发。

产蛋鸡: 目前病情稳定,较少发生疾病。主要以热应激多发。

肉鸡: 以大肠杆菌病、肠炎及中暑多

发。个别养殖场因热应激引起的鸡只死亡率达2%左右。

笔者认为下个月仍以防治大肠杆菌病为主。建议饲料和饮水中适当添加多种维生素、微量元素,同时添加益生菌等调整胃肠道功能。维生素C可有效减少热应激的发生,还能排出体内的毒素,保肝护肾,建议长期应用。

辛集市月强兽药经营部 吕月强

山东地区

肉鸡: 德州地区以20~30日龄的鸡群发病率较高。疾病初期鸡群采食量不增,有不同程度的呼吸道病,治疗一个疗程后,疾病不但未得到控制,反而继发感染气囊炎、腹膜炎、包心包肝。继发感染大肠杆菌病后鸡群死亡率更高,一般可达到30%左右。治疗:建议疾病初期气囊炎药物+大肠

杆菌药物+抗病毒药物一同使用,有助于控制本病。第二个疗程可使用双黄连口服液+康呼(主要成分:恩诺沙星等)+菌特(主要成分:甲磺霉素等)。

其次,肌腺胃炎也时有发生。该病主要表现为:采食量低,剖检无明显的腺胃病变,仅表现肌胃糜烂或溃疡。

河北征宇药业有限公司 郭强

肉种鸡: 山东日照、德州等地区的肉种鸡在100日龄或200日龄左右时普遍发生一种以产蛋率稍下降,排红色粪便为症状的疾病。临床表现鸡冠倒向一侧,颜色发白,产蛋量稍下降,蛋壳颜色变浅;肠壁薄,内容物似胡萝卜样。发病时间较长,综合诊断为慢性小肠球虫。治疗原则:杀虫、消炎、补多维(尤其是鱼肝油),方案:妥曲珠利制剂+肠炎药物,多维、鱼肝油饮水或拌料。治疗时宜穿校用药,选择球虫敏感药物,连用4~5天。一个疗程不能彻底治愈的,再选择使用球虫敏感药物+肠炎药物一个疗程。一般两个疗程可治愈。

肉鸡: 笔者所在地主要是雏鸡和待出栏鸡只,并未表现明显的疾病。

青岛中仁药业有限公司 杨宝彦

辽宁地区

蛋鸡: 以新城疫和流感混合感染的

疾病多发。该病最有效的防控措施就是疫苗免疫。

黑山县慧蕾兽药超市

肉鸡: 近来主要以腺胃肌胃炎和肠道型流感(可参见18页肠道型流感的诊治)的疾病发病率最高。其中腺胃肌胃炎以7~20日龄的鸡群发病率最高,笔者认为主要与当前高温高湿环境有关,高温高湿易导致饲料霉变,从而引起本病的发生。气囊炎疾病也时有发生,主要以15~25日龄的鸡群发病率高,导致气囊炎时有发生的原因与舍内通风不良关系最大。

河北华润药业有限公司 高远智

河南地区

817肉鸡: 7~10日龄以肠毒综合征多发。初期表现粪料,胡萝卜样粪便,有球虫感染,后期腹泻症状严重。治疗措施:上午磺胺类球虫药物饮水,下午乙酰甲唑成分药物饮水,晚上鱼肝油饮水。鸡群生长后期主要多发非典型性新城疫。疾病初期表现零星死亡,3~4天后死亡率增高至0.5%~1%,且呼吸道症状明显。解剖腺胃乳头出血、肠道淋巴滤泡有比较明显肿胀,但较少有溃疡灶发生。治疗措施:上午干扰素饮水2~3小时,下午双黄连成分药物+大肠杆菌药物混合饮水。中暑情况时有发生。

蛋鸡: 新城疫导致的产蛋率下降的疾病较多发。临床表现蛋壳颜色发白、畸形蛋增加,死亡率在0.2%~0.5%。剖检变化为肠道淋巴滤泡肿胀出血,腺胃乳头轻度出血,气管呈环状出血。治疗措施:一是对于无死亡的鸡群或零星死亡的鸡群:克隆303~4倍量点眼,12小时后纯中药双黄连口服液+大肠杆菌药物混合饮水,连用4天,同时生肌D-钙奇(主要成分:骨化醇)+金元素(主要成分:维生素E)拌料连用7天;二是对于出现死亡的鸡群:早上干扰素饮水2~3小时,下午纯中药双黄连口服液+大肠杆菌药物混合饮水,连用4天,同时生肌D-钙奇(主要成分:骨化醇)+金元素(主要成分:维生素E)拌料连用7天。

千口金诺禽畜服务中心 马保刚

蛋鸡新城疫、传染性法氏囊病及大肠杆菌病混感的诊疗

1 基本情况

2011年6月3日,某养鸡场饲养2500只罗曼粉蛋鸡于一周前发病,曾治疗效果不理想,遂于30日龄时前来笔者处救治。

2 临床症状

患病鸡精神沉郁,闭目呆立,翅膀下垂,羽毛松乱,站立不稳,运动失调;采食量和饮水量减少;病鸡张口伸颈呼吸、咳嗽、气喘,口腔内有黏液,出现甩头和吞咽动作,气管有“呼噜呼噜”的湿啰音,打喷嚏、流眼泪,眼结膜充血肿胀,眼睑肿胀;有的鸡喙囊胀气,内有少量黏液,倒提病鸡可从口内流出黏液;病鸡排黄白色、黄

绿色样稀便。

3 剖检变化

解剖患病鸡和死亡鸡只,可见喙囊胀气,内有少量黏液;胸肌、腿肌有条状出血和瘀斑;口腔、气管中有大量的黏液,气管、支气管分叉处有瘀血和出血;心冠脂肪未见出血点;气囊浑浊,内有黄色干酪样物;肝脏表面被覆有白色石灰样包膜;十二指肠、小肠黏膜有弥漫性出血;直肠和泄殖腔黏膜出血;法氏囊略有肿胀,内有少量灰色黏液;肌胃、腺胃无明显病变。

4 病情诊断

经当地流行病学调查,综合分析

以上临床症状及病理剖检变化,初步诊断为鸡新城疫、传染性法氏囊病及大肠杆菌病混感。

5 防治方法

首先,用高免卵黄抗体紧急治疗,控制死亡。在每瓶高免卵黄抗体中加入药物:庆大霉素注射液2毫升×10支,病毒唑注射液2毫升×10支,地塞米松注射液1毫升×5支,混合均匀;每只鸡一次肌肉注射1.2毫升,间隔24小时再注射一次。与此同时,在每100千克饮水中加入50%甲磺酸培氟沙星50克,无疫康(主要成分:干扰素,免疫增效剂等),包被维生素C100克,连用6天。同时中药艾蒿熏蒸散、碘伏鸡舍内消毒。

6 心得体会

回访:用药第2天死亡8只雏鸡,第3天死亡7只雏鸡。用药3天,患病鸡群病状好转。第5天后观察鸡群患病症状基本消失,采食量开始回升。

引发该病的原因:一是管理方面的原因,鸡群密度过大,通风不良,空气污染较严重。二是雏鸡个体发育差,整齐度不高,鸡群个体抗病力差。三是防疫措施不得力,这主要与疫苗质量、接种剂量、接种方法等有关。就该病例来看,与预防过程中未曾使用新城疫—法氏囊疫苗有一定的关系。

由于鸡群已发病多日,鸡只感染较多,病情较重。因此,笔者建议养殖户,首先要加强管理,按时投药,保持适宜的温度,合理通风换气,最佳的饲养密度,对于病情稍重的鸡只,必要时可灌服药物每天2~3次,连续2~3天即可,及时淘汰较严重的病鸡、死鸡,净化鸡场。第二,待鸡群病情稳定后,在饲料中加入健胃增肥散、干酵母、乳酸菌、维生素等,加强营养,帮助消化,促其生长。第三,鸡群病情完全康复之后,按免疫程序免疫一次新城疫疫苗,特别是要注射好新城疫—法氏囊油佐剂灭活苗,这样可以使鸡群保持较高的抗体水平,提高鸡群的抗病力。

河北省馆陶县农牧局畜牧办

马振平



电话:15830630130 QQ:851190431
别忘记,每月5~12号来报噢!

兽药GMP验收通过企业

证书编号:(2006)兽药GMP证字42号

想了解更多产品,请点击网站: <http://www.gaokedb.com>

或直接登录手机网站 gkdb.m.cn

高科动保 健康养殖实践者

拒绝病毒感染,预防焉鸡出现!

快快拨打400-696-4818

提供预防保健方案

投入少,见效快!

招聘 技术服务经理、大客户经理、技术主任、营销代表

应聘电话:13930181826 程经理



石家庄高科动物保健品有限公司

地址:河北赵县兴柏工业区
电话:0311-87785077 85667016(fax)
邮箱: gkdb@163.com