

南方笼养商品肉鸡的疫病防治用药

刘洪兰,胡金兰

(上犹县畜牧兽医站,江西 上犹 341200)

肉鸡生产过程中,疫病防治是决定饲养成败的关键,本人在养鸡生产实践中,总结了一套南方笼养商品肉鸡疫病防治用药经验,现供广大养鸡同仁参考。

1 预防接种

日龄	预防疫病	疫苗名称	免疫方法
8-10	鸡新城疫和传染性支气管炎	鸡新城疫+H120	点眼
12-14	鸡法氏囊病	鸡法氏囊苗或进口鸡法氏囊苗	点眼
21-24	鸡新城疫	鸡新城疫疫苗	点眼
26	鸡法氏囊病	鸡法氏囊苗	饮水

2 预防用药

日龄	预防疾病	药物名称	用药方法
1	提高抵抗力	葡萄糖	饮水
		电解多维	拌料
2-5	消化道疾病	土霉素	拌料
6-7		电解多维	饮水
10-12	球虫病	球清	饮水
19-21	球虫病	抗球王	饮水
不定	呼吸道病	硫氰红霉素	饮水

另外,整个饲养期在进鸡前按每立方米用25mL 甲醛+12.5g 高锰酸钾对栏舍、用具等消毒进行密闭熏蒸消毒;通风后再行季胺盐或氯制剂喷雾消毒。平时每星期消毒2~3次。

3 注意问题

3.1 免疫剂量要适中

过稀或过浓均不行,如增加浓度只能提高抗体水平,但不能延长抗体寿命,故应按期强化免疫,而不能一次性增加用菌数减少防疫次数。且浓度过高,会造成免疫麻痹,而不能促使机体产生更高的抗体。

3.2 药物拌和要均匀

一般先称出若干饲料按比例拌入药粉,拌均后再倒入需配的饲料中再拌匀。

3.3 疫苗点眼

宜采用注射器带针头滴注(1只眼),用滴管易浪费疫苗且用量不准。

3.4 观察粪便

每天应注意观察粪便,一旦出现红色粪便,应投喂抗球虫药,并用量要足,交替使用。

此外,免疫用药前后3d不能消毒。

(收稿日期:2006-11-08)

猪用助产绳的使用技巧

廖利(长益畜牧科技公司,四川 乐山 614804)

母猪难产时,常采取注射缩宫素、校正胎位、徒手掏猪等方法进行助产。但个别由于胎儿过大或母猪骨盆过窄,还有的畸形胎猪,特别是头位难产时靠以上方法根本无法分娩或取出。在猪场或农村要实行剖腹产硬件条件又达不到,况且剖腹产后母猪基本会丧失种用价值。这种情况下,正确使用助产绳就可以轻松解决问题,笔者根据大量生产实践,总结了助产绳的便捷使用技巧。

首先应将助产绳在消毒液里浸泡10min左右,术前先把母猪外阴及后驱清洗干净,灌入适量肥皂液在母猪产道内以起到润滑作用(因为难产猪产道内一般都很干涩)。术者手部消毒后,连同助产绳一起涂上肥皂液,将助产绳纲绳先伸出一点套住左手中指,手心握住助产绳前端缓慢插入产道内(避免粗暴操作损伤产道),待手指触碰到胎猪时,中指向前用力把纲绳牵拉出去,食指、无名指、拇指伸入套内,同时把助产绳前端靠在胎猪的下颚部,右手握住外塑料管往产道内插,左手顺势把手背拱起,手指抓住胎猪往外拉,让纲绳套住其耳后颈部,待确定套稳后,助手握住助产绳环往外拉,这时术者左手应该扶住胎猪,以防损伤产道。术后应及时把工具清洗干净,消毒后妥善保存。

母猪术后应加强护理,搞好卫生,可用甲磺酸培氟沙星+Vc+柴胡输液,益母草50g每天拌料喂服,连用3d,便可有效防治其感染,促进母猪早日康复。

(收稿日期:2007-11-05)

一例猪胎衣感染囊虫病的诊断

汪令四(九成监狱管理分局,安徽 九成 246220)

1 病例 不久前,所在猪场318棚舍1头经产3胎大太(大约×太湖猪)杂交母猪产仔11头,母子健康,胎衣也顺利娩出。在烧煮胎衣时(该场有煮胎衣喂猪的习惯)发现部分胎衣上有豌豆大小的结节,内充满乳白色液体,不易破溃。由于从未见过类似情况,遂提取病料,进行研究分析,综合诊断。

2 诊断 初步怀疑为以下2种疾病:结核结节,寄生虫类囊泡。鉴于该母猪围产期状况良好,猪场从未有过结核病史,豆状水泡也不是结核结节的特征,因此排除结核病,综合诊断为猪的囊虫病。

猪囊虫病是由猪囊尾蚴寄生在猪体内所引起危害严重的人畜共患病,猪患病后平时症状不明显