



# 近期禽病速报

**河北省:**  
冀南  
产蛋鸡:传染性喉气管炎;传染性支气管炎;非典型新城疫;大肠杆菌病;非典型新城疫并发支原体病;非典型新城疫并发大肠杆菌病;产蛋下降综合征。  
青年鸡:传染性喉气管炎;非典型新城疫;大肠杆菌病;非典型新城疫并发支原体病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
肉鸡:传染性法氏囊病;慢性呼吸道病;支原体病;非典型新城疫;大肠杆菌病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
肉鸡:大肠杆菌病;非典型新城疫并发大肠杆菌病;腹水症;非典型新城疫并发支原体感染。  
河北省邢台市兽医院 邢兰君 冀中  
产蛋鸡:非典型新城疫;支原体病;产蛋下降综合征;传染性喉气管炎;非典型新城疫并发大肠

杆菌病。  
青年鸡:传支;非典型新城疫并发大肠杆菌病;非典型新城疫并发支原体感染。  
雏鸡:非典型新城疫;传染性喉气管炎;非典型新城疫并发支原体病。  
肉鸡:传染性喉气管炎;支原体病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
河北省辛集城西郭永庄动物医院 杨爱起  
冀东  
产蛋鸡:产蛋下降综合征;非典型新城疫;传染性喉气管炎;非典型新城疫并发支原体病;慢性呼吸道病并发大肠杆菌病。  
青年鸡:非典型新城疫;传染性喉气管炎;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
雏鸡:非典型新城疫并发大肠杆菌病;大肠杆菌病;支原体病;非典型新城疫并发支原体病。  
肉鸡:非典型新城疫并发支原体病;非典型新城疫;大肠杆菌病;传染性法氏囊病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
河北省滦县三铭动物门诊 窦小波

**山东部分地区:**  
山东东部鸡群前期发生肾传支,后期是呼吸道病与大肠杆菌病混合感染,大家要引起注意。非典型新城疫;产蛋下降综合征;传染性喉气管炎;传染性支气管炎;传染性法氏囊病;非典型新城疫并发支原体病。  
山东省东平县畜牧局 郑延平  
**山西部分地区:**  
非典型新城疫;产蛋下降综合征;传染性支气管炎;传染性喉气管炎;传染性鼻炎;非典型新城疫并发支原体病;大肠杆菌病并发支原体病;慢性呼吸道病。  
山西省浮山县畜牧中心 唐好文  
**河南部分地区:**  
产蛋鸡:非典型新城疫;传染性喉气管炎;传染性支气管炎;产蛋下降综合征;新城疫并发支原体病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
青年鸡:非典型新城疫;传染性喉气管炎;非典

型新城疫并发大肠杆菌病。  
雏鸡:传染性法氏囊病;非典型新城疫并发大肠杆菌病。  
肉鸡:大肠杆菌病;非典型新城疫并发大肠杆菌病;大肠杆菌病并发支原体病;新城疫并发支原体病。  
河南省三门峡市畜牧局 张占朝  
**东北部分地区:**  
大杆菌病;慢性呼吸道病;非典型新城疫;传染性喉气管炎;传染性支气管炎;产蛋下降综合征;非典型新城疫与大肠杆菌病混合感染;支原体病与大肠杆菌病混合感染。  
辽宁北镇环卫饲料门市 双宝饲料店 张桂荣

**网友 veterinary:**  
最近多发的大肠杆菌病,有气囊炎和严重的呼吸道症状,死亡率高,针对这些特点,要搞好预防,认真的消毒,用点好的消毒药,不能舍不得花钱。

**网友好好先生:**  
对于养殖户的鸡群前期出现肾传支,后期发生呼吸道病与大肠杆菌病混合感染的现象,我认为是因为管理和防疫出现了问题;网友鸡将军王建议要注意通风。

**网友黄飞宏:**对近期出现的非典型新城疫,提醒在精神状态可以的情况下,可以紧急接种克隆I系5-8倍量,同时要注意鸡的日龄,24小时后再用对症药物治疗。

**网友启瑞:**目前局部地区流行肾传支,主要是因为管理粗放和应激,尤其是地面温度过低导致发病,养殖户朋友要引起重视,加强饲养管理,避免不必要的经济损失。

**网友和美饲料:**目前各地病毒病还是挺厉害的,非典型新城疫比较多,病毒病和细菌病混合感染也频发,大家要引起注意。



**问:**15天的小鸡如果出现了轻微法氏囊病,死了2只鸡,用抗病毒药能过吗?  
**答:**可注射高免抗体,同时用药物治疗;抗病毒、治疗大肠杆菌病、通肾。  
**问:**微生物发酵菌可以控制和预防大肠杆菌病吗?  
**答:**有益菌的存在可以抑制有害菌的过度繁殖,起到平衡肠道菌群的作用。  
**问:**近期肉鸡成活率低,呼吸道病严重有何良方?  
**答:**肉鸡成活率低原因很多,饲养管理方法、鸡病等因素都很关键。  
**问:**肉鸡饲料中含有少量的地可珠利,得了呼吸道可以用含泰妙菌素成分的药吗?  
**答:**可以。  
**问:**鸡的传染性法氏囊炎为什么会有骤然增料的现象?  
**答:**这种现象与投药有关。  
**问:**我养的是817肉鸡,40天的鸡,粪便特别稀,是什么原因呢?鸡的采食量不好,现在不知道用什么特效药好。  
**答:**粪稀主要有两种情况:1、肾脏病变。2、肠道病变。综合治疗。通肾+止痢+抗菌消炎+退烧。  
**问:**罗曼蛋鸡1900只,505日龄,有什么办法可以降低鸡蛋破损增加蛋壳厚度?  
**答:**决定蛋壳质量的有:植酸酶、石粉、维生素、维生素等。调节一下添加量即可。

## 一种鸡感染鸡刺皮螨的诊治过程

**1 发病情况**  
河北省石家庄市某种鸡场,笼养蛋种鸡5000套,输精员在采精时发现种公鸡的尾部有发黑的体表寄生虫,怀疑是鸡羽虱病,于是在饲料中添加0.02%的阿维菌素驱虫,体表面0.2%的灭虱蝇喷雾杀虫,结果发现,不仅没有效果,而且虫体越来越多,造成种公鸡发蔫,采食量减少,精液品质下降。由于母鸡和公鸡同在一栋鸡舍,母鸡体表也很快出现虫体,产蛋率下降6%~10%。饲养员在采精或输精时,虫体落到手上,衣服上,刺破人血,引起红色丘疹,剧烈瘙痒。后经人介绍用农用的敌敌畏喷雾,虽有效果,但种鸡死亡率明显升高,于是到我处寻求较好的治疗方法。  
**2 临床症状**  
鸡群精神状况尚可,翻开感染鸡的尾部或

腹部羽毛,发现有迅速移动的小黑点,尾部、翅根部、腹部羽毛变成黑色,皮肤也虫体叮咬而结痂龟裂,饮水线上、料槽的边缘缝隙处及地面上,全是密密麻麻的虫体。  
**3 诊断**  
用蘸有杀虫剂的棉签在鸡尾部和腹部蘸取体表寄生虫,置载玻片上,放在10倍光学显微镜下观察,虫体呈淡红色或棕黑色,长椭圆形,后部略宽,体表密生短毛,假头长,螯枝一对,呈细长的针状,有3对足或是4对足,足很长,有吸盘,背板部分比其他角质部分显得明亮。根据其特点,诊断为鸡刺皮螨病。  
**4 治疗**  
4.1 对本栋鸡舍严格隔离,鸡舍内的所有物品禁止外用。  
4.2 清扫鸡舍卫生,在傍晚关灯后20~30

分钟,用天津生产的0.2%除螨灵(精制马硫磷溶液)带鸡喷雾杀虫,喷雾时避开鸡头和料槽,重点喷饮水线、料槽外侧、鸡笼、墙角、粪坑等处。第二天上午清扫鸡舍及清除鸡舍粪便,将清扫物连同粪便一同作堆肥发酵处理,对料槽用清水冲洗数次后再加料。  
4.3 对于感染较严重的鸡只,用小的喷雾器对鸡只虫体较多的部位进行喷雾,也可以用小木棍,在一头绑上脱脂棉,蘸取药液,对螨虫较多的部位涂抹,注意要避开有外伤的部位,以免引起鸡体中毒。  
经过2次这样的治疗后,虫体明显减少,以后每隔5天进行一次喷雾,15天后症状消失,鸡群康复。  
河北省畜牧良种工作站 郭彦军 刘慧芳 闫振富 050061

**1 发病情况**  
河北省乐亭县陆庄村养殖户李某共同养雏鸭900只,以圈养为主,辅以放牧。2009年3月10日早开始发病,养殖户先后应用抗生素和磺胺类药物对整个鸭群进行投药治疗,但不见效果。次日开始死亡,至3月15日先后共死亡雏鸭430只。  
**2 临床特征**  
初期病鸭表现精神高度不振,采食量减少,饮水减少,行动缓慢,羽毛蓬松,怕冷聚堆,咳嗽喘鸣,排白色水样稀便。有的病鸭发病2~3天后,排绿色稀便,粪中带有黏液性泡沫,肛门红肿。病鸭极度脱水,消瘦虚弱,最后衰竭死亡。  
**3 病理变化**  
剖检病死雏鸭15只,所见变化为尸体严重脱水,干瘪;胸肌和股肌有多处点状和条纹状出血;肾脏肿大,表面有出血点和尿酸盐沉积;腺胃和肌胃交接处有弥散性出血,腺胃溃疡,黏膜脱落;盲肠扁桃体出血;肠内容物为淡黄色液体;法氏囊肿大2~3倍,表面呈暗红色,切开在黏膜褶皱

处有大量的出血点,并有黏性黄色分泌物或黄色干酪样栓塞物;肝肿大,呈紫色;脾略肿,呈紫红色,有的表面见有坏死灶。  
**4 实验室检查**  
取病死鸭心、肝、脾组织涂片,革兰氏染色,镜检,未见细菌;取病料经营养琼脂培养基培养未见细菌生长,用鸡传染性法氏囊病标准血清与8只症状较典型的病鸭法氏囊组织悬液进行琼扩试验,结果均为阳性;悬液进行琼扩试验,结果均为阳性;悬液进行琼扩试验,结果均为阳性;悬液进行琼扩试验,结果均为阳性。  
**5 治疗措施**  
首先对鸡舍用多能碘消毒,在全鸭群饮水中加入维生素C、速补-14及葡萄糖。对发病鸭胸肌注射鸡传染性法氏囊卵黄抗体1~2毫升,重症者在注射一次。经采取上述措施后病情得到控制。  
河北省乐亭县汤家河动物防疫站 白贺典 063600

**1 选择优良品种**  
选体型大、生长快、耐粗饲的鸭种。雏鸭保温饲养。刚出壳的仔鸭,要进行温室饲养,室内温度为1~2日龄32℃;3~7日龄28℃,以后22℃~26℃。气温高时育雏气温高时育雏10天,气温低时育雏20天。温室的饲养密度为每平方米8~12只。饲养室要留小门与温室相通,便于雏鸭自由采食和活动。温室可用红外线灯泡或木炭加温,室内温度要适当稳定。饲料和饮水要清洁每天垫草4~5次。天气晴朗,7天后可将雏鸭赶到水池里游泳,待雏鸭毛干后再带入室内。  
**2 圈棚要卫生安全**  
20日龄后即可圈养。设置能防风、防雨的棚,棚外设1个浅水池让鸭游戏。棚内每隔3天垫1次沙,隔7天全棚清洁1次。门窗要装防鼠网。  
**3 精心配制日粮**  
1~20日龄鸭的饲料配方:玉米50%、鱼粉8%、花生饼10%、米糠20%、统糠10%、生长素1%、抗生素及多种维生素0.5%、石灰或贝壳粉0.5%,然后将混合料与青料按1:8的比例混合饲喂。20日龄后鸭的饲料配方:玉米20%、统糠60%、生长素及抗生素1%、贝壳粉或石灰1%,混合料与青料以2:8的比例配合饲喂。  
**4 搞好防疫工作**  
每次进棚前及鸭出售后用2%福尔马林对棚舍熏蒸消毒;打了防疫针的鸭方能让其进场,或进棚后立即注射小鸭瘟血清;经常用五花茶煮水拌料或让鸭自饮,还可用雷公根、路边茵、车前草等熬水喂鸭防病;喂食的菜叶要用清水洗净,并用0.3%高锰酸钾溶液漂洗。  
江苏省滨海县畜牧总站 张仕泉 224500

