


# 蛋鸡生产中不可忽视的问题

在蛋鸡生产中,养鸡户多重视饲料配合,环境温度湿度的控制,定期防疫,季节管理和光照管理等,对以下问题却常常忽视。

**及时断喙** 主要是为了防止鸡群发生啄羽、啄肛等恶癖。断喙通常在6~12日龄进行,断喙前两天应在饲料中添加维生素C、维生素K,防止断喙时出血过多和鸡体产生应激。断喙时应将鸡头略向刀片方向倾斜,使上喙切除1/2,下喙切除1/3,断喙后3~5天应在饲料或饮水中加抗应激添加剂,并保证食槽、水槽充足,避免鸡断喙后因采食、饮水困难而影响生长。而养鸡户常常在30~60日龄才给鸡断喙,这时喙基本长成,血管和神经丰富,会使断喙难度大,对鸡体的应激大,严重影响鸡的生长发育,是养鸡效果不佳的重要原因。

**限制饲喂** 主要目的是为了控制鸡体过肥,抑制性成熟,从而多产蛋,并节约饲料,限制一般从6~8周龄开始,16~20周龄结束。限饲可以减少日饲喂量,也可降低饲料中粗蛋白含量,限饲时应注意:(1)具体限饲时间应根据鸡群平均体重确定。(2)限饲前应剔除病、弱、残鸡。(3)保证足够的食槽和水



槽。(4)注意鸡群健康,一旦发生疫病流行应立即停止限饲。

**淘汰低产鸡** 在实际生产中,养鸡户一般舍不得淘汰低产鸡,认为它多少能产几个蛋。殊不知低产鸡产蛋少而吃料并不少,为了节约饲料,提高经济效益,


及时淘汰低产鸡十分必要,低产鸡的判断标准是:(1)喙黄、冠小、苍白、主翼羽脱落。(2)腹腔小,耻骨间距小,泄殖腔小而干燥。

**强制换羽** 蛋鸡饲养11~12个月后,如果鸡群产蛋率仍较高,市场鸡蛋价也较高,为节省培育新母鸡的时间和费用,可通过对老母鸡采取强制换羽以延长蛋鸡的产蛋时间。具体方法:开始10~12天停止给料,停止辅助光照,只供水;13~19天饲喂育成料,第1天30克/只,以后每两天增加20克;20天开始自由采食,25天开始延长光照时间,每天增加半小时直至16小时光照,待鸡换羽后饲喂蛋鸡料。

**定期驱虫** 定期驱虫,能有效预防鸡的各种肠道寄生虫病,减少饲料浪费,提高饲料利用率,降低成本。驱虫一般分两次进行,第1次2月龄,第2次在鸡开产前,常用左旋咪唑25~30毫克/千克拌料。

**鼠害防治** 在农村,鼠害防治是经常被忽视的问题。老鼠不仅偷吃饲料,咬坏物品,惊扰鸡群,还传播疾病。因此及时杀灭老鼠,是减少饲料浪费,减少疾病传播,提高经济效益的重要措施。具体做法:(1)从建筑和卫生入手。保持卫生,及时清除饲料残渣;用水泥封堵建筑物的小洞。(2)采用多种方法灭鼠,一般以器械灭鼠为好,注意药物灭鼠期间不仅要清除料槽中的饲料,还要关好鸡笼,防止鸡逃出后误食鼠药而中毒。

715203 陕西澄城县王庄镇政府 郭发定



1.金盏花瓣粉。在蛋鸡日粮中,添加0.5%~0.75%金盏花瓣粉(菊料),可使蛋黄颜色明显加深。

2.黑麦草粉。在蛋鸡日粮中,添加5%的黑麦草粉,可使蛋黄色级从6~7级提高到11级。

3.橘皮粉。在鸡饲料中添加2%~5%的橘皮粉,可使蛋黄颜色加深,产蛋量明显提高。

4.孔雀草。在鸡饲料中添加0.3%的孔雀草粉,可使蛋黄颜色从1级提高到6.5级,鸡皮肤及脂肪呈金黄色。

5.苜蓿草粉。在鸡、鸭日粮中,添加7.5%~10%的优质苜蓿草粉,可使蛋黄颜色加深。

6.聚合草粉。在鸡、鸭日粮中,添加5%的聚合草粉,可使蛋黄色级提高6级,并能增加蛋的香味。

7.鲜胡萝卜。在鸡、鸭日粮中,添中30%的鲜胡萝卜,可明显提高蛋黄色级。

8.玉米花粉。把玉米花粉掺入饲料中喂鸡,可使产蛋率提高10%左右,而且蛋色鲜艳,蛋黄量增加。

另外,在蛋鸡日粮中,添加1%沙棘果、0.5%红辣椒、0.2%纯红辣椒粉,或10%的三叶草粉,或添加比例均为1%的香豆草、沙棘叶、姜黄、红花、海藻和海带,或比例均为1%的玫瑰花、紫草、丹参、松针、鸡血藤和党参茎叶,都有很好的增色效果;适当增喂一些南瓜、苋菜等,也有利于蛋黄增色。

271500 山东省东平县农委家属院 李巧云

## 信息快递

9月25日至27日在河南驻马店市举行的“2008年全国农产品加工业博览会暨东西合作投资贸易洽谈会”期间将设免费展示区,企业不用拿钱就可展示产品,参展企业还有可能拿到大订单。展销时间是9月25日至10月3日。