

# 鸡病诊断索引表

为提高提问性发帖质量，便于相互交流学习，萌发搞个东西出来，供非专业人士参考。在一篇宣传资料基础上整理成文。此表类似工具性资料：部位→病变→病名→病因→诊断参考要点→防治方法的格式，符合临床实际诊治基本的方法步骤；由外入内几乎涵盖了主要病理器官；每一种病例都可查到几个主要病变部位。因篇幅过长实在太劳累，完稿后未作文字，内容的详细推敲检查，故难免存在不少错误之处，心到力不足呀...。此表呈上下连接顺序（每两张为一整页面），因页面所限，有些单页字体较，还须谅解。防治方法一栏仅做提示，有意留给读者自己完善。力所能及，仅视劳动好意吧。

鸡冠和肉髯肿大	发绀 水肿	禽霍乱	巴氏杆菌	严重肺炎，充血郁血，肝有针尖状小点出血或黄白色坏死点，有全身性出血败血性症状，心外膜出血，心冠脂肪呈喷洒状出血，肠道弥漫性出血，卵巢和肾脏出血，临床分为：最急性，急性，慢性三种。	菌苗接种，抗生素
		贫血因子	病毒	出壳小鸡体弱，苍白，胸腺，法氏囊萎缩，骨髓变黄，血液稀薄，不易凝固。	
		网状内皮细胞病	病毒	发育不良，矮小，贫血，苍白，肝，脾，淋巴肿瘤，周围神经有淋巴细胞浸润，肿大，会引起类似马立克病的神经症状。	综防
		住细胞原虫病	原虫	急性者咳血，出血，拉血便，慢性有贫血，绿便，产蛋减少，部分脏器出血，特别是肾脏出血明显。	药物
		球虫病	球虫	有肉样便，血便，酱色便，急性小肠球虫多见出血，慢性肠壁多见白色小白点，急性盲肠球虫多见出血，慢性可见盲肠芯子。	药物
		蛔虫绦虫	寄生虫	消瘦，苍白，粪便可排除虫卵，绦虫节片，剖检可见虫体。	驱虫
		肝破裂	多病因	脂肪肝，沙门氏菌，饲料霉变物质慢性中毒，弧菌性肝炎...等引起肝淀粉样变，肝质脆如烂泥。	对症治疗
		猝死症	生长过速	死前一切正常，往往采食期间发生猝死，死前乱碰乱跳，死后见心肌出血，鸡冠苍白。	肉鸡前期适当限控。
		衣原体病	衣原体	鸡冠苍白，有肠炎，绿便，下痢，心肌炎，心肌坏死，眼炎，胰腺炎，羽毛易断无光泽，发育迟缓肌肉萎缩。	药物



苍白 萎缩	慢性 呼吸 道病	支原 体	气囊炎，心包炎，肝包膜炎，眼结膜炎，鼻窦炎，流泪有泡沫状，流鼻液，眶下窦硬肿，有时在腹腔有多量浆液和泡沫。	净化或 药物。
	白 血 病	病毒	发病较晚，全身脏器有肿瘤，包括法氏囊肿瘤，骨髓瘤，但没有神经瘤，没有眼和皮肤瘤。	净化，综 防。
	马 立 克	病毒	发病较早，全身各脏器有肿瘤，但法氏囊极少，没有骨髓瘤，有神经，眼，和皮肤病变。	疫苗，综 防。
	球 虫 病	球虫	常见慢性感染，引起鸡冠苍白，萎缩，有肉样便，少见血便，肠道大多呈针尖大，黄白色弥漫性坏死点变化。	药物。
紫色 冠萎 缩	马 立 克	病毒	开产前后的鸡，马立克病鸡是为深蓝色萎缩，中小鸡患马立克鸡冠多表现苍白萎缩，其它病变同前述。	同前述。
	中毒	药 物 饲 料 变质	厌食，生长迟缓，产蛋下降，死亡增加，软颈，翅垂，死时两脚后伸并有神经症状，有时消化道出血，和心冠脂肪出血。	防 止 中 毒。
发黑 坏死	坏 死 性 皮 炎	梭 状 杆 菌	皮肤同时有坏死，有的皮下蜂窝组炎，可分离出芽孢杆菌。	抗菌素。

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
鸡冠和肉髯	发绀	传喉	病毒	喉头，气管有易剥离的伪膜，急性有咳血或咳出红色粘液，呼吸极度困难，慢性有干酪样物质阻塞气管，眼结膜炎，流泪。	疫苗
		新城疫	病毒	典型病例传播快，死亡率高，嗦囊有多量酸臭液体，气管有粘液，绿便，腺胃乳头出血，肠出血淋巴集合体肿大，出血，溃疡呈枣核样岛屿状为特征性病理变化。非典型病例只有产蛋下降和零星死亡。	免疫
		禽流感	病毒	劣性禽流感有绿便，厌食，颜面肿胀，头颈浮肿，结膜炎，鼻窦炎，心冠脂肪出血，腺胃肠道出血，死亡率高，温和型产蛋率下降，采食略减，有轻度呼吸道症状，零星死亡。	综合防治
		腹膜炎	细菌	腹部膨大，产蛋下降或停产，鸡冠发绀，剖检有腹膜炎，有残存卵黄和干酪样物质。	药物治疗
	热射病	中暑		严重肺充血水肿，气管皮下心外膜出血，胸肌变白呈半熟状。	防暑降温
	冠齿干性坏死	葡萄球菌	细菌	鸡冠锯齿尖，干性坏死，长时间会脱落。	药物
黑头	黑褐色郁血	黑头病	组织滴虫	肝脏有类似扣状坏死灶，盲肠肿胀，内有白色干酪样栓塞，为本病的特征性病变。	药物治疗

和 颈	鳞 样 皮 肤	烟酸和 泛酸缺 乏症	维生素 缺乏	头，脸和足部皮肤粗糙，发干，脱屑，开裂。	补充多维
	颜	禽流感	病毒	颜面肿胀大多为急性，死亡高，温和型很少见颜面肿胀。	
	面	慢性呼 吸道	支原体	有鼻液，咳嗽，肺水泡音，眶下窦有干酪样物质，气囊增厚，混浊，有黄色干酪样物质。	菌苗和药 物
	肿	肿头综 合症	病毒	多发生肉仔鸡，特别是眼眶周围肿大，多伴发大肠杆菌病。	综防
	胀	头部水 肿	油苗注 射部位 不当	油苗注射部位过高，接近头部引起炎性水肿，可自愈。	细心操作
		传染性 鼻炎	嗜血杆 菌	颜面浮肿，鼻腔有炎症，粘液，气管卡他性炎症，产蛋下降，传播快。	药物治疗
	颈 皮 下 有 胶 冻 样 浸 出 物	雏鸡绿 脓杆菌 病	细菌	颈部皮下，腹部皮下，有胶冻样浸出液，肺充血出血，心肌出血，死亡快，8小时—3天死亡可达60%以上。	抗菌素
		雏鸡大 肠杆菌 病	细菌	基本同上，1—5天死亡可达20—30%。	抗菌素



部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
眼	结膜炎	传喉	病毒	同前	免疫
		传染性支气管炎	病毒	气管，喉头有粘液，有眼泪和鼻涕，呼吸困难，雏鸡死亡可达20—30%，蛋鸡产蛋率下降20—50%，产小蛋，软蛋，薄壳蛋，蛋清稀薄似水，在恢复期出现大量畸形蛋，且长时间不能得以好转，输卵管萎缩，肾肿，尿酸盐增多。	免疫
		肾传支	病毒	呼吸道呈一过性，易忽视或误诊，肾肿大2—3倍呈花斑状，肾脏，输尿管有大量尿酸盐沉积，多发于育成阶段，死亡率可达30—50%。	免疫
		慢呼	霉形体	早期感染以结膜炎为主，以后发展为肺炎，气囊炎。死亡率不高，但与大肠杆菌混感，则死亡率增加。	药物
		霉菌性眼炎	霉菌	肺，气囊霉菌结节，严重者肝，肾都有霉菌病灶。	制霉菌素
		衣原体病	衣原体	气囊，肝包膜，心包膜明显增厚，有纤维蛋白性浸出物积聚，肝肿大并部分坏死，脾肿大2—3倍，肿眼，流泪，肠炎。	氯霉素 四环素
	虹彩退色瞳孔缩小	马立克氏病	病毒	马立克氏病分为：内脏型，神经型，皮肤型，眼型，此型为眼型。	免疫

眼	干眼病	干眼病	VA 缺乏	干眼, 全身表皮粘膜发干, 重者角质化, 口腔, 食道, 嗉囊粘膜有伪膜, 易继发痛风。	补 VA 鱼肝油
	白浊失明	细菌性眼炎		沙门氏菌, 大肠杆菌, 变形杆菌, 葡萄球菌等, 其中部分眼炎失明。	药物
	晶体混浊	脑脊髓炎	病毒	运动失调, 脑震颤, 小脑出血, 多发 1 月龄内鸡, 死亡可达 10—50%, 眼病约占 1—3%, 蛋鸡无明显异常, 只表现产蛋下降。	免疫
上呼吸	鼻窦 炎, 眶下 炎, 有分泌物	传喉	病毒	同前, 鼻窦眶下窦有粘液。	免疫
		慢呼	霉形体	单独感染为浆液性粘液, 与大肠杆菌混感时, 为浓性粘液	药物
		传鼻	嗜血杆菌	鼻窦眶下窦有浓性粘液, 有臭味。	药物
	喉头和 气管上 部有伪膜	传喉	病毒	同前, 喉头, 气管有伪膜, 或干酪样物质, 易剥离。	免疫
		鸡痘	病毒	同前, 喉头, 气管伪膜, 不易剥离, 强行剥离会出血。	免疫

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
中呼吸道	气管，支气管炎，粘液增加	新城疫	病毒	同前，有时带血性粘液。	免疫
		传支肾传	病毒	同前，肾传支：支气管炎是一过性的。	免疫
		传鼻	嗜血杆菌	以鼻炎，鼻窦炎为主，也有气管，支气管炎。	药物
		慢呼	支原体	有气管，支气管炎，和气囊炎。	药物
下呼吸道	肺有灰白色结节	沙门氏菌病	白痢伤寒副伤寒	沙门氏菌病可发生任何日龄的鸡，其中出壳雏鸡：主要表现为脐炎，卵黄囊炎，肺炎；10日龄后多表现为肝炎，心肌炎，心包积液，心脏有坏死结节，严重时类似马立克肿瘤样，肝，脾肿大，有灰白色点状坏死灶，胆囊肿大充满多量胆汁，盲肠，小肠有坏死性结节。蛋鸡主要为卵巢炎有变性卵泡似袋状，有输卵管炎，泄殖腔炎，腹膜炎，有时会出现关节炎，脑炎，眼炎并发相应关节病，神经症状和瞎眼。	净化 药物治疗
		霉菌性肺炎	黄霉菌烟曲霉菌	有眼结膜炎，肺炎，气囊炎。	制霉菌素
		禽结核病	结核杆菌	肺，肝，脾，肾，气囊，肠管等处，均有灰白色或灰黄色坏死性结节，有的形成肉芽肿，病鸡消瘦。	

鸡病专业网



肺和气囊)	肺有大小不等半透明病灶，肺充血	马立克	病毒	多在中雏鸡期发生，诊断同前。	免疫
		白血病	病毒	多发生在成鸡，老鸡，诊断同前。	净化
		住细胞原虫病	原虫	多在雨季发生，中小鸡死亡较高，其它同前。	药物
	肺充血水肿肝变样	禽霍乱	巴氏杆菌	同前	药物
	肺充血水肿	热射病	中暑	胸肌呈半熟肉状，苍白，肺充血，水肿严重，呼吸困难。	管理
		雏鸡大肠杆菌葡萄球菌绿脓杆菌变形杆菌等感染			抗菌素治疗
	气囊炎	新城疫	病毒	同前	免疫
		传支	病毒	同前。	

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
下呼吸道	气囊炎	禽流感	病毒	同前	无良策
		慢呼	支原体	大肠杆菌混合感染时，气囊炎，心包炎，肝被膜炎加重，死亡率增多。	药物
		大肠杆菌病	细菌	肺充血，气囊炎，心包炎，肝周炎，卵巢炎，输卵管炎，泄殖腔炎，腹膜炎。	抗菌素
		传鼻	嗜血杆菌	同前	磺胺类
		霉菌病	细菌	同前	制霉菌
		衣原体	衣原体	肝周炎，心包炎，肺炎，眼炎，肠炎	药物
消化道	口腔食道有黄色伪膜周围组织充血	鸡痘	病毒	粘膜型鸡痘除喉头气管外，口腔粘膜也有不易剥离伪膜。	免疫
		滴虫病	滴虫	粘膜呈圆形隆起，不易剥离的白膜，硬性剥离易出血	药物
		白色念珠菌病	念珠菌	口腔或食道有白灰色菌膜，易剥离。	制霉菌素
	口腔食道有伪膜周围组织无出血	VA 缺乏症	VA 缺乏	水泡样白色病灶，心，肝，肾，输尿管等，有尿酸盐沉积，干眼紧闭，公鸡易发。	补充



嗦囊膨大	马立克	病毒	多发 50—90 日龄鸡，植物神经受侵害，发生麻痹引起滞食。	免疫
	念珠菌		采食后，严重酸臭，嗦囊大 2—3 倍，积食不下。	制霉菌素
	大嗝子病	采食异物	嗦囊内充满异物，食物滞留发酵膨大。	手术
	溃疡性肠炎	梭状杆菌	多发 6—14 周龄鸡，肠管溃疡，肝有坏死斑块，水样下痢。	抗菌素
嗦囊积水	坏死性肠炎	梭状芽胞杆菌	小肠中下段有糠麸样粘膜坏死，粘膜脱落，菲薄鼓气，打开腹腔有尸臭味。	药物
	新城疫	病毒	鸡体因感染病毒体温升高，饮水量大而所致。	免疫
腺胃乳头出血	新城疫	病毒	典型新城疫有消化道型，也称速发嗜内脏型，肺脑型也叫速发神经型，消化道型腺胃乳头出血，肠道出血，肠淋巴肿大出血溃疡，呈特征性的枣核岛屿状病理变化，肺脑型呼吸困难，气管，支气管粘液增多，头部发绀，扭脖子，转圈，高死亡。中发型蛋鸡主要是引起产蛋下降，育成鸡个别死亡；缓发型，肠型病变不典型，易误诊。	免疫
	禽流感	病毒	同前	

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
消化道	腺胃间质出血 乳头周边出血	法氏囊	病毒	突然发病，病鸡呈昏睡状，腿部肌肉，胸肌呈条斑状出血，法氏囊肿大，出血，后期萎缩，肾脏肿大有尿酸盐沉积，消化道出血，胰腺有黄白色针尖大点状坏死灶，下痢。	免疫
		非典型新城疫	病毒	免疫鸡群很少见典型腺胃乳头出血，往往见间质出血。	免疫
	腺胃肿大	马立克	病毒	同前，有时鸡群腺胃肿瘤很多，腺胃肿大2—3倍。	免疫
		腺胃炎	病毒	有报道是腺胃型传支，引起腺胃先肿胀后溃疡。	综防
消化	腺胃变薄糜烂 溃疡	腺胃性传支	病毒	呼吸道症状，肾脏病变不明显，主要表现腺胃肿大糜烂。	无良策
		饲料变质 鱼粉变质	毒素	同时有肌胃糜烂灶，肠道其它炎症	改变
肠道	肌胃溃疡	肌胃溃疡	毒素	鱼粉加工时温度过高，产生肌胃糜烂素，饲料变质，药物慢性中毒，在嗉囊，腺胃及肠道有咖啡色内容物，粪便褐色或黑色。	改变
	肌胃有白色结节	白痢	细菌	心脏有结节，肝脾肿大有坏死点，肠有坏死点。	药物



肌胃周 边脂肪 小点出 血	新城疫 禽霍乱 原虫病	病毒 细菌 原虫	急性死亡者可见脂肪出血，其它病变不明显。亚急性，慢性其才表现各自特征。	相应处 治
出血性 肠炎溃 疡坏死	新城疫	病毒	有时只能看到肠道出血，看不见肠淋巴集合体充血，肿大。	免疫
	禽流感	病毒	同上	无良策
	禽霍乱	细菌	同上	药物
	溃疡性 肠炎	梭状 杆菌	感染初期为急性肠炎下痢，继而肠道粘膜深层溃疡，脾肿大，肝肿大有弥漫性或块状黄斑。	药物
	坏死性 肠炎	梭状 杆菌	肠粘膜坏死，出血，脱落，鼓气，有尸臭味，偶而发生坏死性肝炎。	药物
	白痢	细菌	盲肠及附近小肠，有点状纤维化坏死结节。	药物
	衣原体 病	衣原 体	眼炎，肺炎，肠炎，肝炎，心包炎，胰腺炎，下痢，发育迟缓。	药物
	法氏囊	病毒	出血性肠炎，法氏囊充血，出血，水肿后萎缩，腿肌，胸肌有条斑状出血。肾肿大有尿酸盐沉积。	免疫
	球虫病	原虫	小肠炎性出血，肠管增厚，有红点和白斑，有血便，或酱色，咖啡色粪便。	抗球虫 药

部位	病变	病名	病因	诊 断 参 考 要 点	防治方法
消化道	卡它性肠炎	持续性腹泻	轮状病毒 星状病毒	新开产母鸡，持续腹泻 1—2 个月，死亡略升，产蛋略降。	抗菌素
	肠壁肉芽肿	结核病	结核杆菌	常见老龄鸡，常在肠浆膜外形成肉芽肿，肝，脾，肺有坏死结节。	抗菌素
		大肠杆菌肉芽肿	大肠杆菌	小肠，盲肠内壁粘膜，或肝脏形成肉芽肿。	药物
	盲肠出血溃疡	黑头病	组织滴虫	肝脏，盲肠同时有圆形溃疡病灶。	药物
		球虫病	原虫	同前	同前
	肠淋巴集合体充血出血溃疡	新城疫	病毒	这些病变是诊断该病的特征性病变，在其它病变症状不明显时，有这些病变就可以确诊。	免疫

鸡病专业网



肝 脏	弥漫性 肿大	白血病	病毒	俗称大肝病，多发成鸡老龄鸡，垂直传播为主，除皮肤神经外，各脏器均有肿瘤或形成大肝病，部分法氏囊也有瘤变。	净化
		马立克	病毒	临床与白血病不易区分，本病有神经型，皮肤型，没有骨和法氏囊肿瘤，本病发病时间多在育成期，白血病发病多在产蛋期。	免疫
		包涵体 肝炎	病毒	肝肿大变黄有出血点，有时在皮肤，肌肉，浆膜有出血点，骨髓变黄，肝肿大，羽毛粗乱，精神不振。	综防
		弧菌性 肝炎	弧菌	肝呈星状，花斑状坏死，出血，肝包膜常有数个小血囊，常因血囊破裂死亡，慢性肝硬化有腹水，心包积水，贫血，消瘦。	抗菌素
	肝破裂	脂肪肝 出血症	代谢 病	鸡过肥，大多出之产蛋晚期的老龄鸡，肝发黄，肿大，多脂质，	胆碱降 能量
		白痢	细菌	肝肿大淀粉样变，脾肿大，有畸形卵泡，成鸡常发腹膜炎，输卵管炎，泄殖腔炎，肠炎，雏鸡中鸡常见心肌坏死结节。	同前
		慢性中 毒	饲料 变质 长期 用药	肝肿大，淀粉样变，常伴有肾肿，脾肿。	管理

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
肝、脏	有明显的肿瘤结节	白血病	病毒	同前	净化
		马立克	病毒	同前	免疫
		网状内皮细胞症	病毒	类似白血病，但组织学以网状内皮细胞为主。	净化
	有大小坏死结节或肉芽肿	禽结核	细菌	肝，肺，肠，气囊，脾，肾都有坏死结节肉芽肿，多发于老龄鸡。	淘汰检疫
		白痢	细菌	同前，有相应的白痢症状，肝脏有黄白色点状坏死灶。	净化药物
		禽霍乱	细菌	传播快，死亡高，心冠脂肪喷洒状出血，肠道前部卡它性出血，肝脏有针尖大黄白色坏死灶，或出血点。	药物
		弧菌性肝炎	弧菌	同前。	药物
		细菌性肝炎		大肠杆菌，亚利桑菌，变形杆菌等，临床不易区分，通过细菌分离和生化反应，可鉴别。	药物
	肝被膜炎心包	慢呼	支原体	与大肠杆菌混感时，心包炎肝被膜炎加重。	免疫或药物

鸡病专业网

炎↵	大肠杆菌病↵	细菌↵	大肠杆菌病临床有的分为8种，其病理变化不同，用药也存在一定的区别。出壳小鸡多以脐带炎，蛋黄囊炎为主；败血症时，肺炎，心肌出血，肠炎，临床相对损失较大，且较为急性发病；亚急性多发与10—90日龄中，主要表现为心包炎，肝周炎，肠炎，肉芽肿；蛋鸡主要为卵巢炎，输卵管炎，腹膜炎和气囊炎；有时会出现眼炎，脑炎，关节炎，并引起相应症状。多以激发出现。↵	抗菌素↵
	衣原体↵	衣原体↵	同前↵	药物↵
肝青铜色肿大黄斑黑斑↵	禽伤寒↵	伤寒杆菌↵	诊断同白痢，只是肝变绿色青铜样较多。↵	药物↵
	坏死性肠炎↵	梭状芽胞菌↵	肝色青而暗，肠粘膜糠麸样坏死脱落，嗉囊积水。↵	药物↵
	溃疡性肠炎↵	芽胞杆菌↵	肝局灶性黄斑。↵	药物↵
肝萎缩↵	肝硬化↵	慢性中毒↵	肝硬化，常有腹水，肝表面不平粗糙，病鸡消瘦。↵	淘汰↵
	慢性肝炎↵	肝炎↵	其它病变不明显，病鸡消瘦有腹水。↵	淘汰↵
	肝萎缩↵	营养不良↵	其它脏器相应萎缩。↵	增加营养↵



部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
脾脏	脾肿大	白血病	病毒	同前	净化
		马立克	病毒	同前	免疫
		网状内皮细胞病	病毒	同前	同前
		原虫病	原虫	同前	同前
		鸡白痢	细菌	同前	同前
	脾灰色坏死	新城疫	病毒	同前	同前
		禽结核	细菌	同前	抗结核药
胆囊	肿大	沙门氏菌病	沙氏菌	除前述外，常见胆囊肿大3—4倍，内有大量胆汁	净化药物
胰脏	腺体片状出血边缘带状出血有黄白色点状坏死灶	禽流感	病毒	片状出血，边缘带状出血多为本病鉴别特征，黄白色针尖大密集坏死灶多为温和型所致	免高控低，综合防控
		法氏囊	病毒	除法氏囊典型病变外，多见腺体有黄白色坏死灶	免疫

心冠脂肪出血	新城疫	病毒	急性死亡可见心冠脂肪出血，其它如前述	免疫	
	禽霍乱	巴氏杆菌	急性死亡心冠脂肪出血呈喷洒状，其它同前	蜂胶 霍乱菌苗，药物	
	禽流感	病毒	同前	同前	
	原虫病	原虫	同前	同前	
	急性中毒	黄曲霉毒素磺胺类药	有相应临床症状，急性死亡有心冠脂肪出血	管理	
	心室肥大	腹水征	多原因	心室肥大，心肌变薄，跳动无力	管理
	心包炎	禽流感	病毒	同前	同前
	心肌炎	慢呼	支原体	同前	同前
	心肌有半透明坏死结节	大肠杆菌病	细菌	同前	同前
		衣原体病	衣原体	同前	同前
	弧菌性肝炎	弧菌	同前	同前	

疾病专业网

部位	病变	病名	病因	诊断参考要点	防治方法
肾       脏	肿大呈花斑状	传支	病毒	呼吸道病变为主，也有肾病变。	免疫
		肾传支	病毒	同前	
		法氏囊	病毒	同前	
		禽流感	病毒	禽流感会引起肾脏肿大尿酸盐沉积，只是病变相对较轻一点。	
		痛风病	多因素	同前	
		包涵体肝炎	包涵体	同前	
		中毒病	多因素	各种有毒物质经肾脏排除不及时，都可引起肾病变。	管理
		VA 缺乏症	VA 缺乏	VA 缺乏时，肾肿易引发痛风。	同前
	肾表面出血	住细胞原虫病	原虫	心冠，肺，气管，皮下，肌肉，肠道出血外，肾表面出血尤其显著，血液稀薄，内有原虫，多发于雨季有库蠅的地方。	磺胺类
法氏囊	肿大充血 出血水肿 萎缩	法氏囊	病毒	感染后 1—4 天法氏囊水肿充血出血，5—7 天萎缩；变异株为亚临床病症，法氏囊没有肿大，一开始就萎缩。	免疫
	肿瘤	白血病	病毒	淋巴白血病有部分法氏囊瘤变，马立克病极少见，这也是二者一个重要区别之处。	



卵 巢	有柄畸形 卵泡	沙门氏 菌病	沙氏菌	卵泡多有长柄，变畸，不规则，颜色有绿，褐绿，油状，乳酪样，卵黄膜变厚，多发腹膜炎。	净化或 药物
		大肠杆 菌病	大肠菌	同前；以前多认为大肠杆菌不会垂直传播，近来有资料报道，大肠杆菌也会引起畸形卵泡，也会垂直传播。	综防
	软卵泡 卵泡充血 出血	新城疫 禽霍乱 传支 禽流感 住细胞	病毒 细菌 病毒 病毒 原虫	卵泡软，易破碎，充血，出血，紫葡萄样，黑色坏死。感染住细胞原虫病时，血性卵泡会增多。	针对预 防
输 卵 管	潮红充血 出血	大肠杆 菌	细菌	严重者输卵管似开水烫半熟样，多发泄殖腔炎，腹膜炎，卵巢炎。	药物
		住细胞	原虫	各脏器出血，肺，嗦囊，气管中有血性粘液存留，输卵管中见有血斑分泌物。	磺胺类
	萎缩	传支	病毒	输卵管只有正常的四分之一或二分之一，多因早期（约 2—3 周）患病所致。	淘汰
	囊肿积液	传支	病毒	输卵管内有大量积液，多为传支后遗症。	淘汰
		衣原体		论坛有这方面的报道，衣原体会造成输卵管积液，类似传支后遗症。	淘汰