

农户散放本地鸡的饲养管理

赵小虎 首 琪 (陕西省南郑县家畜良种站 723100)

农户有家鸡散放养殖的传统习惯,这种庭院经济生产管理粗放简单,在家禽养殖中占比重较大,是畜牧规模化养殖的补充。散养鸡肉质鲜美,产蛋个大,市场价格好,饲料来源丰富。但若不科学饲养管理,势必存在安全隐患,增加养殖风险。所以应加强引导和提高、转变管理方式,获取最大经济效益。

1 放养场地

农村房前屋后场地宽敞,是很好的饲养场所,可设置足够的水槽和料槽,同时也可圈养。

2 鸡舍建造

鸡舍可做为鸡群栖居、产蛋和防寒的设施,拟建在通风向阳处,采光须充足。舍内置栖架,并将饮水器、食槽均匀分布于舍内。

3 品种与个体选择

品种要求上要选择生产性能较好,抗病力强,市场行情好的品种。个体要求体重足,发育良好,毛色丰满的鸡只。

4 饲养管理

养鸡成教育雏是关键。出壳 30 天内为育雏期,抗寒差。在此期间要重视保温,可用纸箱保温或室内供热源。雏鸡出雏第 1 星期温度需在 35℃ 左右,以后每星期降 3~5℃,至逐渐接近自然温度。

在饲料供给方面,第 1 个月全日喂全价饲料,供足清水,舍内每天清洁消毒 1 次。第 2 个月全价饲料降为 60%,不足部分用自配料和青绿饲料代替。详细配方参见表 1。

鸡群管理从 30 日龄到 165 日龄为饲养“育成鸡”阶段,此时蛋白质需求高,以促进增肥。催肥期笼养效果好,可采取笼养与散养相结合,公母鸡要分开饲养。如做为后备种鸡,饲料蛋白质含量和日粮代谢能可相对低些,95 日龄后注意淘汰品种特征不突出和个体小者。

鸡舍内用砖围出沙池供鸡产蛋,池内定期拌入硫磺、滑石粉驱灭鸡虱和病菌。在饮水中定期加入水溶性维生素、维生素 E 等,可提高产蛋量。

产蛋期适宜温度为 18~25℃,相对湿度应保持在 55% 左右,注意保持舍内空气新鲜。

表 1 自制饲料配方 %

日龄	玉米	小麦麸	稻谷	豆粕	骨粉	食盐	预混料
1~30	60	-	-	32	1.0	0.3	6
31~120	48	6~15	10	20	1.5	0.3	5~6
121~165	53	10	14	15	2.0	0.3	4~5
种鸡	42	10	14	15	2.2	0.3	4~5

5 防治疾病

进鸡前鸡舍及周围环境要彻底消毒,可用生石灰遍撒场地,以后每星期进行 1 次清扫消毒,水槽和料槽用高锰酸钾定期清洗消毒。

免疫接种建议在 7~10 日龄滴鼻免疫新城疫、禽流感疫苗,14 日龄滴鼻免疫法氏囊弱毒苗,28~35 日龄用法氏囊活疫苗饮水免疫。每年春秋肌肉注射新城疫 I 系疫苗和禽流感灭活疫苗。防疫保护率可达 80%。

饲养过程中,可定期在饲料中投喂治疗量 1/3 的抗生素预防鸡白痢、鸡球虫病等常见病。

发现病鸡,应及时隔离和治疗,查明病原,同时对鸡群及时投服预防药物。根据疫病发展情况,对受威胁而又未发病的鸡只进行紧急防疫注射。

畜禽养殖小知识问答

蛋鸡痛风病发病后的主要表现是什么?

主要表现为精神不振,食欲减退,贫血,脱毛,鸡冠萎缩褪色,羽毛蓬乱,有时皮肤瘙痒,自啄羽毛。

鸭传染性浆膜炎的临床症状有哪些?

病鸭精神不振,缩颈嗜睡,脚软不愿走动或行走蹒跚,眼和鼻孔有浆液或粘液性分泌物,眼眶周围羽毛湿润粘连,伴有轻度咳嗽,下痢,排黄绿色稀粪。部分病鸭濒死时出现神经症状,头颈震颤,倒向一侧或呈“角弓反张”姿势。

鸡缺乏维生素 E,会引起哪些不良影响?

除了会引起脑软化,肌肉营养不良,影响鸡的生长发育外,还会造成鸡的产蛋率下降,蛋的受精率及鸡苗出壳率降低。

鸡维生素 B 缺乏表现的症状有哪些?

不吃食,体重减少,鸡冠蓝色,麻痹无力,头向后翻,小鸡下痢,足趾内卷,不能站立。