

· 养殖技术 ·

雏鹅喜水但怕潮



雏鹅喜水,但却怕潮湿。事实证明,湿度是各种畜禽生长发育的主要因素,尤其是调节系统还不健全的雏鹅,一旦湿度不适宜,往往会造成畜禽生长不良,导致各种疾病的发生和引起死亡。

主要症状:雏鹅生长缓慢,食欲减退,羽毛松乱,不能行走,跛行,关节肿大。

发病原因:

连续阴雨,雏鹅较长时间关在禽舍中,通气不良,缺乏运动,加之阴雨垫料更换不及时而使其发病。

防治方法:严格把握“雏鹅喜欢玩水,但却怕潮湿”的习性和生理特点,严格育雏期间的管理,具体措施。

1. 保持舍内干燥,勤打扫粪便,勤更换垫料。
2. 要定时驱赶鹅群,增加运动量。
3. 把雏鹅移到干燥的鹅舍。
4. 对发病雏鹅进行单独治疗,每只雏鹅每日肌肉注射青霉素、可的松2次,剂量根据鹅的大小而定。

(洪学 吉林省大安市龙沼镇农科站畜牧组)

一、雏鸡的饲养管理

100只小母鸡配15只小公鸡,雏鸡拥挤在围栏一边;说明有贼风侵袭,从第4天开始扩大围栏,添加料盘,6~7日龄进行断喙,水中添加21—生命素有效缓解应激,在育雏前期保温为主,适当通风,10日龄进行免疫接种,3周龄拆除围栏,饮水器每天要消毒剂(威立消)清洗消毒一次,4周龄进行称重,41日龄更换饲料,夏季气温高时,应进行通风,添加新生VC适当降温,防止热应激。



柴种鸡 饲养技术

二、育成期的饲养管理

12周龄进行第二次挑选,挑出杂色,温度保持在22度,16周龄光照最多不超过17小时。

母鸡体重2.8kg,公鸡体重3.5kg做种用。

三、种蛋的管理

收蛋应每2小时一次,一天5次。空棚2周进行冲洗,用威立消做四次消毒。低于50g的蛋挑出来,蛋库温度为18~22度,湿度为70%。

(王志芳 河南明磊动物药业有限公司)

· 专家特稿 ·

一、细菌感染:

1. 表现:在怀孕任何阶段发生流产。有流产先兆,后期感染即发生死产和产弱仔。

2. 病因:人、畜、野生动物共患的慢性、接触性细菌布氏杆菌感染。病原通过生殖道、消化道、呼吸道以及正常皮肤、黏膜感染。性成熟的猪最易感染,感染后延及全身,并长期存于某些局部组织。

3. 诊断:怀孕母猪流产和产弱仔。流产不易察觉,病变为流产胎衣水肿、有坏死灶,流产胎常见皮下肌间出血性浆液浸润,胸腔积液,胃、肠、膀胱黏膜出血,母猪经一胎流产后,一般回复正常生产;公猪睾丸炎,一侧或两侧睾丸肿大;慢性关节炎。

二、病毒感染:

引起死产、木乃伊、死胎和不孕,多数

不引起流产。一窝仔猪中有几头木乃伊或一窝仅产4头以下仔猪,可认为是病毒感染特征的表现,如猪瘟。

猪瘟:

1. 表现:母猪怀孕时如感染猪瘟强毒,母猪本身不出现症状,但病毒可通过胎盘侵害胎儿;或感染了低毒力株的怀孕母猪,同样会出现繁殖障碍。

2. 诊断:母猪无症状,但产木乃伊、死仔和弱仔。若仔猪带毒出生不久即出现拉稀、四肢麻痹而死亡。剖检病死仔猪见腹腔沟浅淋巴结出血肿大,肾苍白,表面有针尖大小出血点。

(赵慧星 河南省新密市畜牧局 杨建春 河南亚卫集团)

母猪繁殖障碍 病因及防治措施(二)

