

**防治** 改善鸭舍卫生条件,保持通风干燥;群体治疗;每吨饲料中加入 5%普东乐健(氟苯尼考)2kg,连用 3~5d;同时每 50kg 水中加 100g 加能速补,连饮 5d;对少食或不食的病鸭每天肌注 0.5%的氟苯尼考 1ml,连用 3~5d;每天坚持清理鸭舍,进行消毒,连续一周。

经采取上述措施后,病情迅速得到了控制。

(226432)江苏省如东县新店畜牧兽医站

张冰斌,左松清

(226403)如东县岔河畜牧兽医站 刘霏

#### ⊕雏鸡一氧化碳中毒的诊治

**发病情况** 2007 年 2 月 7 日我站接到报告,塔哈其乡某鸡场饲养的鸡出现大量不明原因死亡,笔者等立即前往调查处理。经调查,2007 年 1 月 28 日场主艾某从夏某种鸡场购回雏鸡 300 羽,30 日早上发现有 50 多羽死于育雏室内,怀疑是饲料中毒,我站将饲料取回饲喂其它雏鸡并未发现中毒事件,每天仍有 50 多到 100 羽不等数量的雏鸡死亡,而且绝大部分在晚上死亡,曾用多种抗生素和抗病毒药物治疗无效,至 2 月 7 日共死亡雏鸡近 250 羽,同场的 100 羽成年鸡未见异常。现场检查发现,育雏室内用煤炉作热源给雏鸡保温,煤炉没有烟囱,煤球燃烧过程产生的废气全部排放在育雏室内,育雏室门窗全部关闭,室内煤球燃烧产生的气体刺鼻,几乎使人窒息。初步判断为一氧化碳中毒。

**临床症状** 病鸡体温升高,全身皮肤呈樱桃红色,精神高度沉郁,反应迟钝,羽毛松乱,翅下垂。眼结膜潮红,瞳孔扩大或缩小。呼吸浅而急促,呈明显的间歇性不规则呼吸。脚冷厥,软弱无力,行走时步态不稳,有的伏地不起,部分病鸡脚爪干枯。病鸡还可出现拉稀,有的可伴发神经症状,死前出现强直性痉挛,呈角弓反张。

**剖检变化** 死鸡全身皮肤呈樱桃红色,有的出现暗红色斑块,血液呈樱桃红色,并且凝固不良。肺瘀血、肿大,心包积液,心肌变硬,心包膜、心冠状脂肪有针尖样出血点。肝肿大、瘀血、质地较脆,有的肝表面有灰白色坏死灶,胆囊肿胀。肠系膜、肠粘膜呈樱桃红色。

**诊断** 病鸡皮肤呈樱桃红色,血液呈樱桃红色,且凝固不良;取病鸡血 1 滴加入到 1 杯水中,混合后溶液呈微红色;取病鸡血 5 滴,加水 10ml,再加 10%

NaOH 5 滴,混合后溶液呈粉红色,诊断为雏鸡一氧化碳中毒。

**治疗** 立即将鸡转移到室外空气流通的地方,停止使用煤炉供热保温,同时打开门窗,保持鸡舍内的空气流通。

饮水中添加葡萄糖和电解多维,同时在饲料中添加维生素 C,连续饲喂到鸡的中毒症状全部消失后,再喂 1 周。

(844700)新疆莎车县畜牧兽医站

孙俊奇,郑新华

#### 门诊推介

##### 立腾禽病防治技术推广中心

**立腾绿色生态牧业有限公司**现已形成“公司+门诊”的连锁模式。立腾禽病防治技术推广中心是皖北地区以“门诊技术”服务于养殖业的禽病诊断中心,采用医院式管理、连锁经营,经验丰富的专家坐诊,良好的就诊环境、细致周到的服务,使我们成为同行中的佼佼者。现有职工 10 人,其中大学本科 4 人,高级职称 2 人,汇集国内外名厂商动物保健产品,辐射皖北地区八县二市,包括三个门诊:

☆一门诊:在尤集镇与铜山禽病门诊部合作创办铜山禽病技术服务网站、立腾禽病防治技术推广中心。

技术咨询电话:0557-6661848

☆二门诊:在灵璧县西关与县畜牧局合作创办立腾禽病防治技术连锁。

技术咨询电话:0557-6036287 6027688

☆三门诊:在光彩城 A 区 2 栋 19-21# 与铜山禽病门诊部合作创办立腾禽病防治技术连锁。

技术咨询电话:0557-3935176

在奋斗中,我们感受到创业的艰辛;在收获中,我们品尝着成功的喜悦。感恩社会,回报人们。我们怀着坚定不移的信念,努力拼搏、奋勇前进,诚邀各界养禽朋友与我们一起“携手立腾,你我共赢”,携起手来、风雨同舟、共铸辉煌。

欢迎各界门诊与养殖朋友登陆中国禽病门诊信息网:[www.chinaqbmz.com](http://www.chinaqbmz.com)。

地址:(234218)安徽省灵璧县尤集镇

立腾绿色生态牧业公司 立腾禽病防治技术推广中心

李雷

手机:13965325848

电话:0557-6664441

E-mail:lilei5848@163.com