

秋 来 谨 防 鸡 痘

张仕权 李 亮

鸡痘是危害鸡的一种高度接触性传染病，近几年来发病症状愈来愈严重，由单项皮肤型鸡痘变化为多种混合型鸡痘。此病秋冬春三季十分流行，养殖户应超前进行综合防治。

1 鸡痘的主要特征

1.1 皮肤型

身体无毛部位特别是鸡冠和脸部出现痕状肉瘤。病初皮肤上出现灰白色小结节，很快增大呈黄色，互相融合，形成大结节，突出皮肤表面，结痂可存3-4周之次。后逐渐脱落，形成白色斑痕。皮肤型鸡痘一般没有全身症状。患病雏鸡和幼鸡精神萎顿，食欲大减，体重减轻，病重鸡会失明，甚至死亡。

1.2 混合型

在鸡的口腔和咽喉黏膜上发生纤维素性坏死炎症。在黏膜上生成黄色小结节，后互相融合在一起，形成一层黄白豆腐渣样假膜，覆盖在黏膜表面。个别鸡眼结膜浑浊不清，有的出现失明而影响采食，有的病鸡咳嗽甩头，努力把喉头处的阻塞物咳出，张嘴。打开口腔可看到喉头处有荚膜阻塞。除以上症状之外，另一特征是鸡冠、肉垂、爪、眼皮上有数量不等，如绿豆大小的丘疹，有的丘疹表面破溃，有的已结痂，病鸡归终死亡。

2 综合防治措施

对少数鸡只发病应采取隔离措施，谨防传染，对鸡舍地面，墙壁有周围环境用2%氢氧化钠消毒，对鸡笼、水槽、料槽等带鸡用百毒杀进行全面消毒。同时加强通风换气，饲料维生素、矿物质、微量元素用量加倍，并添加磺胺类等抗菌素防继发感染。

在治疗中，对鸡冠、肉垂、爪、腿痘病鸡，用镊子剥离痘痂后，伤口涂擦紫药水。对眼部肿胀者，用2%硼酸水冲洗眼部，用5%蛋白银溶液和盐酸吗啉胍眼药水滴眼。对传喉型鸡痘，可用小镊子将黏膜上的伪膜剥离取出，然后于患病灶吹上少许“喉症散”粉，每天1次，连用3d即可。

对发病鸡群，用盐酸吗啉胍饮水，比例为0.4%，连用5d，同时饮水中加丁一胺卡那霉素，以防止继发感染。同时，配合中药治疗：龙胆草90g、板蓝根60g、升麻50g、金银花40g、野菊花40g、连翘30g、甘草30g，将上述中药加工成细粉，按每只鸡每天1.5g的用量，均匀拌入饲料内，分上、下午集中喂服。饲料内增加多种维生素、鱼肝油，以增强鸡体的抗病力，保护皮肤和促进伤口愈合，连用5d。通过采食综合性防治措施，3d后病鸡群可基本痊愈，5d后鸡群可全部恢复健康。

（通讯地址：江苏省滨海县三中港畜牧总站224500）