



## 养好乌鸡须抓

### 四环节

乌鸡不仅羽毛全黑，而且骨头也是乌黑的，由于乌鸡品种单一，生活力差，抗病力低，致使雏鸡的成活率不高。根据乌鸡的饲养特点，要重点抓好以下四个环节。

**卫生防疫** 鸡舍内外要用20%的火碱水消毒，墙壁用10%的石灰水粉刷。垫草要勤晒勤换。食槽、饮水器等每天要洗刷干净，每15天要用1%~2%苛性钠溶液消毒一次。清扫出的粪便和垫草要远离鸡舍深埋。

**药物控制** 雏鸡孵出后的前14天，每天在饲料中加万分之四的痢特灵或4000单位的氯霉素控制副伤寒和白痢。15日龄后，每天喂万分之一的痢特灵或按饲料量的千分之二喂5天磺胺二甲基嘧啶。然后停1~2天再喂。45日龄后，要防治蛔虫。另外，8日龄、25日龄、66日龄接种鸡新城疫苗。

**精心喂养** 乌鸡成活率的高低、育肥的快慢与管理的关系很大。因此，发现病鸡应及时隔离饲养。发现快慢不一，体质强弱不均的鸡，要分群饲养。鸡舍的温度在幼雏阶段要保持在30~32℃，以后可随幼雏的生长，每7天降温1~2℃，最后，保持在20℃，夜间温度（室温）比白天高2℃为宜。

**饲养配方** 根据鸡在不同生长时期对营养需要的不同，供给全价饲料，比例是：玉米50%、高粱10%、鱼粉12%、豆饼8%、肉粉8%、麦麸5%、叶粉2%、矿物质磷和钙1.5%、生长素适量。为了加快育肥，一般每昼夜喂3次，长期光照。这样，一般90日龄就可达到出售标准。（杨光）



## 水貂乳房炎的治疗

母貂在三种情况下易得乳房炎：①仔貂咬破母貂乳头，造成外伤性感染。②貂舍垫草不洁感染乳房炎。③母貂泌乳量大，仔貂吮乳力不强或仔貂死亡，过多乳汁蓄积于乳房内，造成淤滞。

母貂患乳房炎后不愿护理仔貂，常停留在运动场上，由于仔貂得不到足够的乳汁而会发出不正常的叫声。检查乳房可发现乳房红肿、结块、发热，乳头或乳房被咬破，个别的则会破溃。

治疗母貂的乳房炎，一般情况下用青霉素20万~30万单位，每日2~3次肌肉注射。对未破溃化脓的可做热敷治疗，用温热的0.3%雷夫努尔溶液浸湿纱布后敷在乳房上进行按摩，每日2次；对已化脓破溃的不能进行热敷，要用0.3%雷夫努尔溶液洗净创面，并涂油质青霉素。仔貂30日龄后，可适当分出部分仔貂，必要时全部分窝。（刘波）