

一、选好鸡苗。即选择健康的雏鸡，这是养鸡能否成功的关键。为提高育雏成活率，购雏时必须严把质量关，进行严格挑选，确保种源可靠、鸡种纯正和鸡苗健康，切不可贪图便宜购进不健康的苗鸡。

二、防寒保暖。冬春季节气温变化大，如果温度过低，肉鸡身体卷缩，互相挤压取暖，影响采食和活动，不但增大消耗，降低饲料利用率，而且容易腹泻或发生呼吸道病等，因此一定要按照温度变化及时做好防寒保暖工作。

三、把握湿度。育雏时一般温度都比较高，容易造成湿度过低，从而导致舍内空气干燥，粉尘飞扬，极易感染呼吸道疾病和大肠杆菌病。鸡舍内湿度过小，还易造成鸡体内水分的大量散失，造成脱水。湿度过小时可采用地面洒水、空中喷雾、火炉上加水盆等措施来增加湿度。

四、科学防疫。根据当地鸡病流行情况，制订符合本场实际的免疫程序，并按要求及时接种各种疫苗。商品肉鸡接种疫苗的方法主要有滴鼻点眼法、气雾法、饮水法和肌肉或皮下注射法。所选用的疫苗应该来自正规厂家或经国家主管部门认可的进口疫苗，正确贮存和使用。

五、合理用药。由于肉鸡生长速度快，鸡只组织代谢旺盛，鸡只免疫力下降。在治疗疾病时尽量不要大剂量的使用对肾脏刺激性大和影响采食的药物，如磺胺类药物和红霉素等。要结合自身鸡场的发病情况制定合理的用药程序。有些饲养户贪图便宜，从非正规渠道购入伪劣药品。或者盲目用药，中毒时有发生，不但容易产生抗药性，而且给今后的治疗用药带来困难。因此必须正确使用药物，加强生物安全，减少甚至避免疫病的发生。

六、重视消毒。这是养鸡成败的又一个关键环节，除进鸡前的彻底消毒外，必须加强平时的卫生消毒工作，场区门口和鸡舍门口要设有消毒池，并经常保持消毒药的有效浓度，进出场区或鸡舍要脚踩消毒。饲养管理人员要穿工作服，鸡场限制外人参观，更不准运鸡车进入生产区。饲养用具应固定鸡舍使用，饮水器每天进行洗刷消毒，然后用水冲洗干净，对其他用具也要定期进行一

次消毒。严禁贩死鸡的小贩子入内。


七、适时分群。分群饲养控制密度是保证鸡群健康、生长均匀的重要因素。一是在雏鸡到达育雏室时，挑出弱雏、小雏单独隔离饲喂，残雏应予以淘汰，以净化鸡群；二是在雏鸡首次免疫时，把个头小、长势差的雏鸡单独隔离饲喂。三是肉仔鸡公母分群饲养，公母分群后分别调整日粮水平，更好地提高饲料利用率。

八、供足饮水。鸡饮水不足，会影响肉鸡生长。因此，要设置足够的水槽，水温保持在10℃左右。在三伏天里，每天上午10点至下午5点要每2小时换水一次，每天刷洗消毒饮水器具1次，保证供给充足清洁饮水。要保持鸡舍内外排水畅通，舍内清洁干燥。

九、做好环卫。舍内垫料不宜过脏、过湿，灰尘不宜过多，用具安置有序不乱，经常杀灭舍内外蚊蝇。对场区要铲除杂草，不能乱放死鸡、垃圾等，保持经常性良好的卫生状况。

十、强化通风。肉鸡饲养密度较大，每天会产生大量的废气和有害气体。为了排出水分和有害气体，补充氧气，并保持适宜温度，必须加强鸡舍通风，降低鸡舍臭味和有害气体浓度，改善肉鸡生长环境。进行通风换气时，要避免贼风，可根据不同的地理位置、不同的鸡舍结构，不同的季节、不同的鸡龄、不同的体重，选择不同的通风方式和通风量。（714100 陕西华县畜牧兽医站 雷晓英）

冬养肉鸡十要点



食醋控制母猪发情 用食醋控制母猪发情效果好。断奶2个月左右的育肥母猪，当体重达到50公斤左右时，每头母猪用0.25公斤的食醋拌料饲喂，每天1次，连用2天。淘汰母猪每头用食醋0.5公斤拌料饲喂，连用3天，这样不但能很快控制母猪发情，而且还能加快育肥速度，提高养殖的经济效益。（辛学）

养殖
小知识

27