

春季如何

延长蛋鸡的产蛋高峰期

春季是蛋鸡的产蛋旺季，当产蛋率达80%以上时即进入了产蛋高峰期，最高峰时可达90%以上。通常春季蛋鸡产蛋高峰期只有3个月左右，若采取措施则可使产蛋高峰期延长到4~5个月。延长春季产蛋高峰期的时间，可直接提高蛋鸡全年的总产蛋水平，使蛋鸡的饲养效益得到有效提高。这里介绍几种延长蛋鸡春季产蛋高峰期的特效方法：

1. 防御冷应激。春季气候虽然逐渐回暖，但有时仍有气温突降或返寒现象，蛋鸡有可能一时不能适应低温的刺激而发生冷应激，直接影响蛋鸡的正常产蛋。因此，春季应仍加强防寒工作，注意天气变化，谨防鸡舍内气温剧烈下降。

2. 提供足够的蛋白质。产蛋高峰期，母鸡对蛋白质的需求量随着产蛋率的上升而增加。蛋鸡产蛋率每上升10%，其日粮中的粗蛋白质含量应相应提高1%，到鸡群产蛋率达到90%时，日粮中的粗蛋白质含量应为19%。

3. 保证蛋鸡适宜的采食量。蛋鸡的采食量主要与日粮的能量有关，能量高时食量少，能量低时食量多。食量过大或过小均会造成蛋白质的浪费或不足。一般蛋鸡日粮每公斤饲料含代谢能11500焦耳左右即可。

4. 科学补钙。产蛋高峰期间，鸡对钙的需要量增加，日粮中钙的含量应由日常的3%提高到3.5%~4%。但日粮中钙的含量也不能过高，否则易影响鸡的食欲。

5. 补充适量的添加剂。产蛋高峰期，每吨饲料中应添加多维生素100克，维生素AD粉、氯化胆碱、蛋氨酸、微量元素生长素各1公斤。

6. 执行正确的光照制度。产蛋高峰期，鸡群每天的光照时间需达到16小时。光照时间一旦确定则不能减少，否则易引起产蛋率下降。而光照时间过长则会增加蛋的破损率。光照强度以每平方米地面3~5瓦为宜。

7. 搞好疫病防治。在蛋鸡的产蛋高峰期，除按计划免疫接种外，平时饲料中应添加一些抗菌素，以有效预防疫病的发生，特别是在场外疫病流行期间更应如此。还要切实搞好饲养管理工作，保证充足清洁的饮水，加强防寒保暖，搞好环境卫生，这样可以减少疫病的发生。一旦发生疫病应及时治疗，传染病要隔离治疗，并紧急预防接种，搞好消毒工作，力求使蛋鸡在产蛋高峰期少患病或不患病，确保延长产蛋高峰期和保持高产蛋率。

贵州畜牧技术推广中心制作
摘自《农家实用技术》

