

科学抓好限饲期

提高种鸡产蛋率



近年来，农户规模饲养种蛋鸡越来越多，然而种

蛋鸡管理水平的高低，直接影响产蛋率和蛋的质量，关系到养种蛋鸡的经济效益。限饲期的科学管理，是提高产蛋率和蛋的质量的重要环节。体质和体重一致的母鸡群，性成熟和性成熟也一致。鸡群均匀度越高，进入产蛋高峰期越快，产蛋率越高，蛋的大小越均匀，质量越好，效益越高。否则，高产鸡也不能多产蛋。如优质黄鸡一般年产蛋量130~150枚，管理得好年产蛋可达180~200枚。为此，必须科学地抓好限饲期管理，提高鸡群的均匀度。限饲期的科学管理，是提高产蛋率，取得最佳种鸡饲养效果的关键。现结合生产工作实践，谈谈限饲期管理关键性技术。

叶秀杰 叶康木

食料桶50~60个，饮水器40~45个；如果是自动饮水器，每个饮水器可供50只鸡饮水。

四、喂料要科学

限饲期鸡群喂料最好每天早上1次，如果将喂料分2~3次投喂，抢食能力强的几乎每次比弱的都能抢到更多的饲料，影响群体整齐度。喂料通常饲喂蛋白质含量、能量水平低的饲料，但要注意多种维生素和矿物质的比例，并且要根据分群的测重情况制定给料量。原则上在限饲期递增料量，体重大的料量少增加，体重小的料量多增加些，做到对体重大的不能限饲过度，对体重偏小的可以加喂一些料。给料量一般1周制定1次，或根据生产实际制定。

五、加强鸡舍的管理

鸡舍要求具有在不利气候条件下保护鸡的基本设施，良好舒适环境条件。平时要加强鸡舍的通风换气，冬季要注意保温，四周通风的鸡舍要采取一定的保温措施，舍内温度不要低于10℃。要加强鸡舍垫料的管理，避免鸡舍内的垫料潮湿，发现有潮湿的垫料要及时更换，以防鸡患脚疾和鸡球虫等疾病。

六、注重卫生防疫工作，确保鸡群健康

要注意种鸡限饲期的免疫工作，按期接种疫苗，特别是禽流感疫苗。一般情况下，疫苗接种在产蛋前全部接种完成。要加强场区的清洁消毒，保持舍内外环境卫生，要加强鸡群的巡查工作，特别是每天早晨和夜间都应留心观察鸡群，留心鸡群粪便的变化，一旦发现异常，立即查找原因对症下药，确保鸡群的健康。

一、育雏、育成期合理分群

合理分群是提高鸡群均匀度的主要措施之一。育雏、育成期都要据蛋鸡大小、强弱进行分群，可采取眼观、手感或过称的办法，同时还应分性别饲养，通过合理分群，科学管理，使进入了限饲期的鸡群均匀度一致。

二、饲养密度合理，群体大小适中

饲养密度过大，则鸡群活动受到限制，生长发育受阻碍，导致鸡群的均匀度下降；如果密度过小，则会浪费房舍的利用面积，加大饲养成本；育成期以每平方米6~7只为宜，每批鸡可划分成多个小群体，每个群体500~600只，这样有利于管理。

三、配备足够的食槽、料桶、饮水器具

限饲期鸡群常处于饥饿状态，喂料时争抢激烈。要使鸡群均匀，必须保证每只鸡几乎同时吃到料、水，为此，必须保证有足够的采料、喝水空间。通常情况下，500只鸡配

524500 吴川市畜牧局；524543 吴

川市覃巴镇畜牧兽医站）广州市农业技术推广中心制作

摘自《广东农村实用技术》